so überraschend vollkommenen Erhaltungszustand aus, dass manche neue Details erkannt und bereits beschriebene mit grösserer Sicherheit als bisher gedeutet werden konnten. Die betreffenden Stücke konnten an die von Häckel beschriebenen Arten *Rhizostomites admirandus* und *lithographicus* angeschlossen werden. L. v. A m m o n bestätigt die von Häckel und B r a n d t vorgenommene Einreihung dieser Arten zu den rhizostomen Medusen, bei welchen bekanntlich das Mundrohr durch mehrere wurzelförmige Arme mit Saugmündchen ersetzt wird, und zwar aus folgenden Gründen. Die Ausbildung der Mundscheibe entspricht vollkommen der der jetzt lebenden Rhizostomen, die Randfäden (Tentakeln) mangeln gänzlich und die Muskulatur ist eine überaus kräftige. Die beiden genannten Arten stehen einander, wie schon Häckel hervorgehoben hat, sehr nahe, dürften aber vorläufig besser noch auseinanderzuhalten sein. Dagegen ist v. A m m o n geneigt, den *Hexarhizites insignis* Häckel nur als eine zufällig nach der Sechszahl ausgebildete Form von *Rhizostomites lithographicus* zu betrachten. Es ist natürlich unthunlich, auf alle Einzelheiten der Beschreibung und Deutung einzugehen, wir müssen diesbezüglich auf die Arbeit selbst verweisen und begnügen uns hervorzuheben, dass sich an den jurassischen Medusen Merkmale nachweisen liessen, welche gegenwärtig auf verschiedene Familien der Rhizostomen vertheilt sind. Für die Rhizostomiten wird daher die besondere Familie der *Lithorhizostomeae* aufgestellt.

Anhangsweise wird ein Ueberblick über die bisher bekannten fossilen Medusen gegeben¹⁾ und hiebei *Medusites latilobatus* beschrieben, eine Form, die aus cretakischem Feuerstein von Hamburg stammt und bereits von Zittel in seinem Handbuch der Paläontologie erwähnt wurde.

C. v. J. Franz Babanek. Ueber das Příbramer Fahlerz. Min. u. petr. Mitth. 6. Band, 1. Heft, pag. 82—86.

Der Verfasser gibt in diesem Aufsätze eine Reihe von chemischen Analysen, die von dem Herrn Hauptprobierer C. M a n n in Příbram ausgeführt wurden.

Die Analyse des Fahlerzes vom Franzisci-Gange führt nach Abzug des neben dem Fahlerz vorhanden gewesenen Siderit und Sphalerit auf folgende Formel:

die des Fahlerzes vom oberen Schwarzgrübner-Gange ebenfalls nach Abzug der oben erwähnten Mineralien auf die Formel:

Es sind also diese beiden Fahlerze nach derselben Formel $5MS + 2SbS_3$ zusammengesetzt, nur ist bei dem ersteren das Kupfer zum Theil durch Blei ersetzt. Der Verfasser gibt auch die Analyse kleiner Fahlerzkrystalle vom Fundgrübner-Gange der Annagrube, die auf die Formel:

führt und der gewöhnlichen Formel für die Fahlerze entspricht, wobei jedoch ebenfalls ein Theil des Kupfers durch Blei ersetzt erscheint. Zum Schlusse führt der Verfasser noch die Analyse eines Bournonits vom Franzisci-Gange an, die der gewöhnlichen Formel des Bournonits $2SbS_3 + 4SbS + 2Cu_2S$ entspricht.

¹⁾ In diesem Capitel wird auch eine von K n e r aus dem cretakischem Feuerstein der Nizniówer Gegend beschriebene Art, *Medusites cretaceus* erwähnt. Das Original-exemplar hiezu, sowie zu dem von K n e r gleichzeitig besprochenen Seestern befindet sich im hiesigen paläontologischen Universitätsmuseum, wo ich mit Herrn Prof. N e u m a y r diese Stücke näher zu prüfen Gelegenheit hatte. Es zeigte sich, dass nur einfache ring-, beziehungsweise sternförmige Infiltrationen von Eisenoxydhydrat vorlagen und die Deutungen von K n e r ganz bestimmt als vollkommen irrig betrachtet werden müssen. *Medusites cretaceus* ist aus der Liste der Fossilien gänzlich zu streichen.