

# GEOCHEMISCHER ATLAS DER REPUBLIK ÖSTERREICH 1:1.000.000 ( BÖHMISCHE MASSE UND ZENTRALZONE DER OSTALPEN )

Herausgegeben von der Geologischen Bundesanstalt, Wien 1987

Autor : F.Thalmann ( VOEST-ALPINE AG )



Bachsedimente: Fraktion <0,18 mm (<80 mesh)  
Element: **MOLYBDÄN**


Projektvorbereitung: Geologische Bundesanstalt – O.Schermann

Probenahme, Dokumentation: Bleiberger Bergwerksunion – I.Cerny,  
Geologische Bundesanstalt – J.Meyer, G.Malecki  
VOEST-ALPINE AG – W.Ronge

Analytik: Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal/Geotechnisches Institut – E.Schroll  
unter Mitarbeit von P.Dolezel, I.Janda, N.Müller, D.Sauer



Geostatistik, EDV: VOEST-ALPINE AG et al. – G.Hausberger, O.Schermann,  
unter Mitarbeit von M.Moser, J.Gumpinger

Auftraggeber: Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie,  
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung,  
Österreichische Industrieverwaltungs AG,  
VOEST-ALPINE AG




**ANALYTIK:**  
ICP-OES nach Säureaufschluß. Nachweisgrenze 0,1 ppm. Werterfassung ab 0,1 ppm.

**GEOSTATISTIK:**  
Rasterzelle: 1 km x 1 km  
Berechnungsmodus: Gewichtetes Mittel über die Analysen der nächsten 8 Probenpunkte  
Gewichtung: 1/D<sup>2</sup>  
Suchradius: maximal 5 km; durchschnittlicher Abstand vom Zellenmittelpunkt zu den nächsten 8 Probenpunkten: für 95 % der Rasterzellen <3 km  
für 75 % der Rasterzellen <2 km  
Glättung der Rasterwerte mit einer 3x3 Matrix



Übersicht der Detailkarten 1 : 50.000




Nach dem Rasternetz der OK 50-Karten des Bundesamtes für Eich und Vermessungswesen

© Geologische Bundesanstalt, A-1031-Wien, Rasumofskygasse 23. Direktion: T.GÄTTINGER.  
Gestaltung und technische Bearbeitung: O.BINDER. Technische Ausführung: F.A. für Kartographie und Reproduktion der Geologischen Bundesanstalt. Druck: Lithopress, Wien.

Verteilung der Probenahmegebiete

- Bleiberger Bergwerksunion 1980
- Bleiberger Bergwerksunion 1981
- Geologische Bundesanstalt 1978
- Geologische Bundesanstalt 1979
- VOEST-ALPINE AG 1978
- VOEST-ALPINE AG 1979
- VOEST-ALPINE AG 1980
- VOEST-ALPINE AG 1981



Probenahme

Probenanzahl insgesamt: 29.717  
Probenfläche:  $\approx 1,4 \text{ km}^2/\text{Probenpunkt}$   
Probenart: Rezentes Bachsediment  
Probenahme: Nach Richtlinien der GBA-Wien 1978/1979 und ÖN G1031  
Probenahmebereich: 20 bis 50 m im Bachverlauf  
Probengewicht: ca. 1,5 kg Rohprobe  
Probenbehandlung: Trocknung bei 55°C und Absiebung der Fraktion <0,18 mm (<80 mesh) für die Analytik

- Böhmische Masse**
- Granite, Orthogneise, Granulite und verwandte Massengesteine
  - Metamorphikum
- Tertiäre Becken**
- Molasse und Inneralpine Becken
  - Alpen
  - Flyschzone, Helvetikum
  - Mesozoikum der Nördlichen und Südlichen Kalkalpen
  - Paläozoikum, Quarzphyllit

Geologische Übersichtskarte

