Mit Benützung der alten Aufnahmen von Michael Vacek (1884) unter der Leitung von K. A. Redlich, H. Hausenbek und F. Seeland (1920-22)

Fortsetzung gegen N. und Ergänzung der Aufnahmen von Wilhelm Hammer (1931), Schluß südlich und der Aufnahmen von J. Hißleitner (1928) mit eigenen Aufnahmen (1926/27) überlassen v. W. Hammer

ADMONT und HIEFLAU

4953



1 junge Anschwemmungen in Täler

3 Moore

2a Bergwerkshalden

Rutschungen

4b Bergsturze

2 Schuttkegel u. Halden

12 Schuttkegelmoräne

7a Terrassenschotter und Sande

6 Einzeitliche Moränen

10

56 53 c

57 Graphitreiche Schiefer u. Phyllite

54 cc

58 Quarzconglomerate in denselben

55 ck

59 Kristallirie Kalke " "

56 cg

Flasrige Kalkglimmerschiefer " "

61 58 sd

Erzführender Kalk (Silur-Devon)

62 58a Fe

Rohwand u. Spateisenstein

63 57 S

Kieselschiefer u. schwarze Tonschiefer (= „Silurschiefer" auf Blatt Bärneck)

64 60 pa

Grauwackenschiefer

65 61 qc

Quarzconglomerate in denselben

66 62 kc

Flasrige, sericitische Kalkconglomerate u. Kalkbreccien

68 64 ch

Albitführende Chloritschiefer und Hornblendeschiefer

69 65 as

Asbestführender Schiefer von Trieben

70 66 A

Diabasamphibolit der Kaiserburgalm

71 67 Pg

Blastoporphyroide

67 63 cs

Glimmerschiefer

Sequentinischer Kreidekalk

Kalkling Gstatt

72 68 ph

Phyllit

60 57 Q

weiße Quarzite u. Quarzschiefer der Pfaffenbuchschichten

73 69 G

Biotitgranitgneis

74 Präsiveis-marin 70 Gm

Aplit

71 g

75 Biotitschiefergneis

76 gq

Granitquarzit

aufgelassene Bergbaue u. Schurfe

auf Eisenerz | auf Kupfererz

Originalaufnahme am XI/XII 1931. D. Grill

Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt Wien
Inv.-Nr. A 06965
Standort K 75
Ordnungsz. 4953-14
A. —
Verrechnungsz. 2