

parts of the Southalpine Adamello batholith (e.g., MARTIN et al. 1993), sinistral transpression along the Northern Giudicarie fault would bring them to a greater depth during northwards transport instead of exhuming them relatively to the north-easternmost Adamello batholith, such as indicated by the ZFT data. This problem can be solved by a 3-phase model for the emplacement of the tonalitic lamellae. In a first step, at the Eo-Oligocene boundary, the northeastern units of the Adamello batholith intruded adjacent to the straight, dextral strike-slip Periadriatic Line. In the Late Oligocene/Earliest Miocene the NNW-ward movement of the Southalpine indenter leads to a bending of the fault and material from the northeastern tail of the Adamello was squeezed to the NE along the bent part of the fault. Finally, in the Early Miocene, the brittle Passeier-Northern- and Southern Giudicarie faults sinistrally dissect the bent part of the Periadriatic line. Along the northern part of the bend a nearly continuous tonalitic body persists along the Meran-Mauls fault as the subsequent brittle deformation took mostly place along the Naif fault in the footwall. Along the Northern Giudicarie fault small bodies were sheared from the former bent and already boudinaged tonalitic body, transported southwards, and exhumed by sinistral transpressive deformation.

The differences in ZFT ages between the Paleogene tonalites within the fault and the overlying Austroalpine basement infer differential exhumation within the hanging wall of the Northern Giudicarie fault with higher inferred exhumation rates closer to the fault. This interpretation is supported by a zircon fission track age of 11 Ma from a sample from the Tonale nappe, positioned very close to the Northern Giudicarie fault.

Within the footwall of the Giudicarie fault system the ZFT data also provided new insights. From the three main Permian plutons present along the Giudicarie fault system, the northernmost (Brixen pluton) and the southernmost (Kreuzberg pluton) yielded ZFT ages of about 100 Ma, while the intermediate Ifinger pluton cooled through the zircon partial annealing zone only in the Miocene. The Ifinger granodiorite overthrusts the Southalpine basement and the Permian rocks of the Athesian Volcanic District along the NW dipping brittle Naif fault. On this thrust fault an important age jump from Miocene to Permian ZFT ages can be observed, whereas across the Meran-Mauls fault further towards the NW nearly no change occurs. These data argue for an exhumation of the Ifinger pluton along the Naif fault when the Kreuzberg and the Brixen pluton had already cooled to below app. 200 °C.

HURFORD, A.J. & GREEN, I.R. (1983): The zeta age calibration of fission track dating. - Isotope Geoscience, 1: 285-317.

MARTIN, S., PROSSER, G. & MORTEN, L. (1993): Tectono-magmatic evolution of sheeted plutonic bodies along the north Giudicarie line (northern Italy). - International Journal of Earth Sciences, 82: 51-86.

POMELLA, H. (2010): The Cenozoic evolution of the Giudicarie fault system (Eastern/Southern Alps, northern Italy). A geochronological, structural and paleomagnetic study. - PhD-thesis, Institute of Geology and Paleontology, University of Innsbruck.

Kinematik und tektonische Geomorphologie der Lavanttal-Störung, Kärnten

POPOPNIK, A.¹ & DECKER, K.²

¹ Vienna, popa3@gmx.at;

² Universität Wien, Althanstrasse 14, 1090 Vienna

Das Lavanttal-Störungssystem ist eines der bedeutendsten Systeme der Ostalpen mit etwa 12km dextralem und einigen km vertikalem Versatz (LINZER et al. 2002), das während der im Miozän fortschreitenden Nord-Süd gerichteten Verkürzung zwischen dem europäischen Vorland und der Adriatischen Platte entstand. Das inneralpine Lavanttal-Becken ist eines der tertiären Becken, die aufgrund der ostgerichteten Ausgleichsbewegung zur Nord-Süd Verkürzung an einem Releasing Bend des Lavanttal-Störungssystems gebildet wurden.

Die strukturgeologische Bearbeitung einer Vielzahl von lokalen Aufschlüssen im gesamten Lavanttal erbrachten kinematische Daten mikrotektonischer Strukturen, die auf eine komplexe Störungsgeschichte mit älterem dextralen strike-slip Versatz an der Störung und einer jüngeren Phase der Störungsinvolution mit sinistralem Schersinn hinweisen.

Die geomorphologische Bearbeitung des von den Gebirgsmassen der Saualm und der Koralpe begrenzten Tales ist relativ eindeutig, ist doch schon beim visuellen Vergleich beider Bergketten deren unterschiedliche Morphologie klar ersichtlich. Geomorphologische Parameter (z.B. Mountain Front Sinuosity, Flussgradienten, Hypsometrisches Integral usw.) lassen sowohl auf aktive Seitenverschiebungen und Abschiebungen an der Front der Koralpe schließen, als auch auf relative Hebung der Koralpe an einem Releasing Bend der aktiven dextralen Störung.

Die berechneten Werte weisen aber auch darauf hin, dass Erosionskräfte der Hebung sehr gut entgegenwirken können, außerdem zeigt sich die zeitliche Abfolge von Kippen des Tales und der später erfolgten Bildung der Schuttfächer (Transverse Topografie Symmetrie Faktor).

Die erfassten geomorphologischen und strukturgeologischen Daten werden durch seismologische Belege eines immer noch aktiven Lavattal-Störungssystems, die aus Verteilung der regionalen Seismizität, störungsparallelen Isoseisten und Herdflächenlösungen abgeleitet werden, gestützt.

LINZER, H.-G., DECKER, K., PERESSON, H., DELL'MOUR, R., & FRISCH, W. (2002): Balancing lateral orogenic float of the Eastern Alps. - Tectonophysics, 354 (3-4): 211-237.

Scheelitvererzungen im Thurntaler Quarzphyllitkomplex, Osttirol: Petrographische und chemische Untersuchungen an Nebengesteinen und Bachsedimenten

PORTUGALLER, T. & RAITH, J.G.

Department für Angewandte Geowissenschaften und Geophysik, Montanuniversität Leoben, A-8700 Leoben