

Zur Fauna des alpinen Lias in Tirol.

Die Abhandlung von Stöckhert über die Mollusken der
Hierlatz-Schichten in den Schriften der k. k. Akademie
der Wissenschaften veranlaßte mich das in hiesiger
Anstalt hinterlegte Material zu untersuchen.

In der Hierlatz-Schichten des Sonnwendjoches bei
Boislegg fand ich folgende Species:

1. *Pecten subreticulatus* Stoll.
2. *Discobolix orbis* Stoll

Aus den Adonetherschichten der Kameckas bei Wai-
ding liegen vor:

1. *Trochotoma striatum* Körner
2. *Veritopsis elegantissima* Körner. Das Exem-
plar ist beträchtlich größer als die Abbil-
dung von Stöckhert.
3. *Pleurostomaria cf. coarctata* Stoll.

Von anderen Gastropoden liegt je ein schlecht erhal-
tenes Exemplar vor, keines gehört einer der von Stö-
ckhert beschriebenen Species an, doch ist eine Bestimmung
ohne zahlreiches Material nicht wol zu wagen.

Ueberdies fand ich auf der Kameckas im rothen
Marmor das nicht bestimmbare Bouchostich eines
Auster u. einem langen Cidaritenstachel.

Dr. Adolf Pichler

