Liebster Freund!

Die Freude Ihrer Gesinnung mit dem Leitgesteine ist dann sehr schwach andrang, wie ich sie ohne einzugreifen Fortbewegungen bei Herr Unger fand. Endlich erhielte ich [illegible] die eine nähere Angabe enthält. Unger bemerkte unter der Bestimmung Nullipora ramosissima Lin. ein Gebilde was seinen Kreis auf Spondylus nicht, welches doch eine Mannichfaltigkeit nicht selten eine Petrefakten wird, aber nach Ungers Bemerkung keine Polypenart, sondern eine Kalkinkrustirte Alge ist, welche fruchtbare in unregelmäßigen Massen in allen Meeren angetroffen sind. — Die [underline]nächste[/underline] Absicht — sobald ich [illegible] die genauere genetische Untersuchung [illegible] — [illegible] ähnliche Gebilde in Leithakalk aufzufinden [underline]können[/underline], worauf übrigens Reichenbach's Folge, daß das Leithakalk seinen [illegible] Entstehungsgrund [illegible] gefunden sei. Es gelingt sich nämlich in niemanden zu können, wie diese Gebilde irgendwo in Verbindung mit Leithakalk gesehen zu haben. Die [illegible] Gesellschaft [illegible] sich also wieder [illegible] mit [illegible]

Mit vielen Grüßen

Ihr

Reissek

Wien am 20. Januar 853.

Geologische Bundesanstalt
Geological Survey of Austria

Geologische Bundesanstalt
Geological Survey of Austria