

# LETTINO

DEI

Museo di Zoologia ed Anatomia comparata  
della R. Università di Torino

N. 171 pubblicato il 27 Aprile 1894

VOL. IX

## I MOLLUSCHI dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria

descritti  
dal Dott. FEDERICO SACCO

### PARTE XV

Fam. CYPRAEIDAE Gray 1824.

Gen. Cypraea Linn. 1740.

Sottog. Mauritia Troschel 1863. — *M. apenninensis* Sacc.

Sottog. Basterotia Bayle in Jouss. 1884. — *B. leporina* (Lk.) e var.  
*praecedens*, *lyncoidea*, *tauromarginata*, *taurogibbula* e *taurospirata*.  
— *B.?* *sublyncoidea* (D'Orb.) e var. *taurorotunda* ed *extuspirata*.

Sottog. Mandolina Bayle in Jouss. 1884. — *M. gibbosa* (Bors.) e var.  
*mucronatoides*, *pergibba* e *longantiqua*.

Sottog. Lyncina Troschel 1863. — *L. minor* (Grat.) e var. *conjugens*.

Sottog. Pantherinaria Sacc. 1894. — *P. pantherina* (Sol.) (tipo del  
nuovo sottog.) var. *fossilis*.

Sottog. Vulgusella Jouss. 1884. — *V. orbigniana* (Grat.) e var. *colli-*  
*gens*, *Genei* e *macrodonta*. — *V. subrostrata* (Gray)? var. *Haveri*,  
*perlabiata*, *tauroplanata* e *taurospirata*.

**Nota.** — Allo scopo di rendere più rapida la pubblicazione della presente Opera, in modo da condurla a termine in breve tempo, d'ora in avanti, invece che nelle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, essa verrà pubblicata a parte, a spese dell'autore (come i precedenti fascicoli IX, X, XII, XIII 2° e XIV), e messa in vendita presso la libreria Loescher di C. Clausen — Torino.

**N.B.** — (Per acquisti complessivi e per abbonamenti all'Opera, presso l'autore, sconto del 10%).

Sottog. **Zonaria** Jouss. 1884. — *Z. subexcisa* (Braun) e var. *explendens*, *ovatoitalica*, *postsphaeroides*, *subiniquidens* ed *inaequilabiata*. — *Z. globosa* (Duj.) var. *taurodenticulata*, *tauroovalis*, *taurospira*, *taurotriangularis* e *tauroparvula*. — *Z. fabagina* (Lk.) e var. *juvenoaspira*, *crassidentula*, *Brochii*, *expansa*, *marginatissima*, *tauroannulus*, *extusdentata*, *impura*, *elongatula*, *amygdalum*, *annularia*, *tauromagna*, *laterimata*, *tauroporcellus*, *dertamygda-  
loides* e *mioporcellus*. — *Z. pinguis* (Bon.) e var. *longovulina* e *spiratina*. — *Z. porcellus* (Br.) e var. *pseudotypica*, *pliocylindrica*, *plioglobosa*, *Cocconii* e *subarostrata*. — *Z. utriculata* (Lk.) e var. *apyriformis*, *nucula*, *plioamygdalum*, *pseudamygdalum*, *derto-  
fabagina* e *dertocolligens*. — *Z. sanguinolenta* (Gmel.) var. *colum-  
baria* e *taurolonga*. — *Z. flavigula* (Lk.) e var. *longiscata*, *tauro-  
praecedens*, *spirapatens*, *pseudocylindrica*, e *substolida*. — *Z. derto-  
flavigula* Sacc.

Sottog. **Proadusta** Sacc. 1894. — *P. splendens* (Grat.) (tipo del nuovo sottog.) var. *parvitala*, *denticulata*, *longitala*, *submonetaria* e *ri-  
mulata*. — *P. subatomaria* (D'Orb.) var. *extusplicata*, *subarostrata* e *nudispira*.

Sottog. **Erosaria** Troschel 1863. — ? *E. erosa* (L.).

Sottog. **Naria** Gray 1856. — *N. planodentata* Sacc. e var. *taurodentata*.

Sottog. **Luponia** Gray 1832. — *L. oligovulacea* Sacc. e var. *pyru-  
latrix*, *taurosimplex* e *taurolongiuscula*. — *L. ovulina* (Grat.) var. *ovulaea*, *rotundocrassa*, *gracililabiata*, *interruptedentata* e *juvenogracilis*. — *L. oligolaevis* Sacc. — *L. Jousseamei* (Bay.) var. *longapenninica*, *proalgoensoides* e *pseudodentata*. — *L. subphysis* (D'Orb.) var. *tauramygdalum*, *algoensoides*, *tauroperlonga*, *tauro-  
labrosa* e *dertotransiens*. — *L. labrosa* (Bon.) e var. *miocolligens*, *dertoconjungens*, *parvoastensis* e *parvolonga*.

Sottog. **Luponovula** Sacc. 1894. — *L. oligovata* Sacc. (tipo del nuovo sott.) e var. *extusdentata*.

#### Gen. **Trivia** Gray 1832.

Sottog. **Trivia** (str. sensu). — *T. europaea* (Mont.) e var. *coccine-  
loides* ed *antiquosphaera*. — *T. sphaericulata* (Lk.) e var. *parvo-  
sphaera*, *retusoides*, *obsoleta*, *perobsoleta*, *pseudavellana*, *propea-  
vellana* e *parvavellana*. — *T. Grayi* (Micht.). — *T. affinis* (Duj.) e var. *pseudasulcata*, *taurominor*, *taurodimidiata* e *dertominor*. — *T. avellana* (Sow.) var. *dertonensis*, *dertoparvula*, *avellanula* e *testudinella*. — *T. dorsolaevigata* (Cocc.) e var. *sulconitens*. — *T. dimidiata* (Bronn) e var. *laevisulculata*.

Sottog. **Pusula** Jouss. 1884. — *P. pediculus* (L.) var. *subpediculus* (D'Orb.).

Gen. **Pustularia** Swainson 1840.

Sottog. **Jenneria** Jouss. 1884. — *S. laeviappenninica* Sacc. e var. *sulculata*, *costicillatior* ed *acarinata*. — *S. duclosiana* (Bast.) e var. *taurolaevis*, *asulcolaevis*, *sulcicauda*, *amplesulcata*, *propus-tulata*, *ovatolaevis*, *subasulcolaevis* e *laevissima*.

Gen. **Erato** Risso 1826.

Sottog. **Erato** (str. sensu). — *E. laevis* (Don.) e var. *subcypraeola*, *dertincrassata*, *cypraeola*, *pernana*, *elongata*, *brevispira*, *labian-gulata*, *subalata* ed *uniplicata*. — *E. spiralis* (Dod.).

Sottog. **Eratopsis** Hoern. e Auing. 1880. — *E. Barrandei* (H. A.) var. *planulosa*, *subasulcata*, *taurasulcata* e *subagranulosa*.

Fam. **AMPHIPERASIDAE** H. e A. Adams.

Gen. **Amphiperas** Gronovius 1781 (**Ovula** Brug. 1789).

Sottog. **Neosimnia** Fisch. 1884. — *N. spelta* (L.) e var. *pliomajor* ed *acutogracilis*. — *N. passerinalis* (Lk.) e var. *subbiconica*, *plio-transiens* e *birostroides*.

Sottog. **Volva** Bolt. 1798 (*Radius* Montf. 1810). — *V. taurinensis* Sacc.



PARTE XVI.

Fam. CANCELLARIIDAE H. e A. Adams 1853.

Gen. **Cancellaria** Lamarck 1799.

Sottog. **Trigonostoma** Blainv. 1826. — *T. oligolongum* Sacc. e var. *aequivaricosa*. — *T. protrigonostoma* Sacc. — *T. umbilicare* (Br.) e var. *Bellardii*, *ligustica* e *parvotriangula*. — *T. taurocrassum* Sacc. e var. *subauriculata*. — *T. scabrum* (Desh.) e var. *taurocosticillata*. — *T. cassideum* (Br.) e var. *spiratior* e *paucicostata*. — *T. dertocassideum* Sacc. — *T. miocenicum* (Dod.). — *T. ampulaceum* (Br.) e var. *turritior*, *acosticillata*, *scabroides*, *tauroparvula* e *tauropercostata*. — *T. gradatum* (Hörn.) var. *dertumbilicata* e *tauroconnectens*. — *T. senestratum* (Eichw.) e var. *taurelongata*, *depressocostata*, *supracostulata*, *tauracuta*, *polonica* e *dertopostica*. — *T. taurolaevigatum* Sacc. e var. *laevior* e *cancellatina*. — *T. imbricatum* (Hoern.) var. *dertocosticillata* e var. *crassocostata*. — *T. crassicosta* (Bell.) e var. *gracilina* e *percostatula*. — *T. scrobiculatum* (Hoern.) e var. *costicillatina*. — *T. Michelinii* (Bell.) e var. *compressula*, *percrassulata*, *percostatoacuta* e *costatissima*. — *T. subacuminatum* (D'Orb.) e var. *costulatior* e *convexior*.

Sottog. **Scalptia** Jouss 1888. — *S.?* *dertoscalata* Sacc. e var. *exscrobiculata*, *hirtocostata*, *ovoidolaevis*, *suprafasciolata* e *pseudotribulus*.

Sottog. **Nevia** Jouss. 1888. — *N. hebertiana* (Hörn.). — *N. taurofaeolata* Sacc.

Sottog. **Ventrilia** Jouss. 1888. — *V. trochlearis* (Fauj.) e var. *taurinia*, *alternicostula*, *sulcata* e *pseudovilia*. — *V. obsoleta* (Hoern.) var. *taurolatior* e *taurocostatior*.

Sottog. **Ovilia** Jouss. 1888. — *O. dolilaris* (Bast.) var. *umbilicina* — *O. Bernardii* (May.) var. *taurocaudata* e *tauroaspira*.

Sottog. **Gulia** Jouss. 1888. — *G. acutangula* (Fauj.) e var. *decussata*, *depressicosta*, *longojuvenis* e *scalariformis*. — *G. Gestini* (Bast.) e var. *taurinia*, *taurofasciata*, *crassopostica* e *compressohirta*. — *G.?* *taurangulifera* Sacc. — *G. westiana* (Grat.)? var. *tauroparvula* Sacc. — *G. exwestiana* Sacc. var. *pyramidata*, *perproducta* e *fusascalaris*. — *G. mutinensis* (For.) e var. *pyramidalospira* e *cacellowestiana*.

Sottog. **Solatia** Jouss. 1888. — *S. piscatoria* (L.) var. *minor*, *pseudotypica*, *crassicosticillata* e *transhirta*. — *S. hirta* (Br.) e var. *major*, *peracuminata*, *turrita*, *multicostata*, *laevilabris*, *suboblitecostata*, *colligens* e *dertosimplex*. — *S. Barjonae* (Da Costa) var. *der-*

- toturrita, nodulosissima e taurospinosa.* — *S. Doderleini* (May.) e var. *laticostata, convexior, raricostata e turritula.*
- Sottog. **Calcarata** Jouss. 1888. — *C. calcarata* (Br.) e var. *trapezium, ampleumbilicata, scalaratula, spinosissima, quadrulata, basicosticillata, dertopercostata e tauroconnectens.*
- Sottog. **Tribia** Jouss. 1888. — *T. uniangulata* (Desh.) e var. *multicostata, bicosticillata, pseudocoronata, pluricostulata, dertopercostulata e dertolyratoides.*
- Sottog. **Bivetia** Jouss. 1888. — *B. cancellata* (L.) var. *pluricosticillata, suprafasciata, perscalarata, infracosticillata, pseudonassoides, astensis e taurelongata.* — *B. dertonensis* (Bell.) e var. *dertonassoides, compressospira, angulatina, subbiplicata, tauroobliquata, taurinia, tauroturris, taurocosticillata e taurocompressa.*
- Sottog. **Bonellitia** Jouss. 1888. — *B. Bonelli* (Bell.) e var. *turgidula, unicosticillata, laevicolligens e cancellatula.* — *B. serrata* (Bronn) e var. *dertonensis, pauciserrata, simplicicostata, compressula ed aequicosticillata.* — *B. dertocrenata* Sacc. — *B. evulsa* (Sol.) var. *taurinia, taurelegans, rotundulatior, semiacostata, pseudacostata, crassevaricosa, miolonga, oligocancellata, costatonodosa e nodosissima.* — *B. multicostata* (Bell.). — *B. tauroconvexula* Sacc. e var. *infracosticillata.*
- Sottog. **Contortia** Sacc. 1894. — *C. contorta* (Bast.) (tipo del nuovo sottog.) e var. *taurinia, tauroturr Rita, dertocontorta, eximbricata e rotundulina.* — *C. Altavillae* (Lib.) e var. *strictoturr Rita.* — *C. neglecta* (Micht.). — *C. deshayesiana* (Desm.) e var. *longonassoides e mericoides.* — *C. callosa* ? (Partsch.) e var. *taurolaevior e tauroturr Rita.*
- Sottog. **Uxia** Jouss. 1888. *U. deperdita* (Micht.) e var. *turrituloides.*
- Sottog. **Sveltia** Jouss. 1888 — *S. oblita* (Micht.). — *S. varicosa* (Br.) e var. *perlypica, simplicior, persuturata, bicosticillata, dertosuturata, miocenica e tauraspina.* — *S. dertovaricosa* Sacc. e var. *magnoturr Rita, spinulatior e subasuturata.* — *S. angulovaricosa* Sacc. — *S. taurinia* (Bell.) e var. *mioconnectens e parvoturr Rita.* — *S. lyrata* (Br.) e var. *spinulosa, dertoconvexulata, dertocostatissima, biperspinosa, miocentica, taurinia, taurangulosa e taurobispinosa.* — *S. intermedia* (Bell.) e var. *afasciata e plioligustica.* — *S. tribulus* (Br.) e var. *latefasciata, perscalaris, junior e costicillatissima.* — *S. fusospinosa* Sacc. — *S. taurospinulosa* Sacc.

Gen. **Aphera** H. e A. Adams 1853.

*Aphera Dufourii* (Grat.). — *A. Bronni* (Bell.) e var. *subareticulata* — *A. ovatocrassa* Sacc.

Gen. **Massyla** H. e A. Adams 1853.

*Massyla labrosa* (Bell.)

Gen. **Broechinia** Jouss. 1888.

*Broccchinia mitraeformis* (Br.) e var. *tauroparva*, *subanodosa*, *anodosomagna*, *depresso-plicata*, *paucicostulata*, *subasuturata*, *laevifasciata* e *pyramidalis*. — *B. crassinodosa* Sacc. — *B. parvula* (Beyr.) var. *bicaninata*, *pluricarinata* e *supracosticillata*.

Gen. **Admete** Möller 1842.

*Admete fusiformis* (Cantr.). — *A. costellifera* (Sow.) var. *fuso-convexa* e *crassicosticillata*. — *A. nassiformis* (Segu.) var. *laevicolumella*, *quatuorcostata* e *Dregeri*.

---