

Extrait du tome III, 3^e série, de la Société des Sciences, des Arts
et des Lettres du Hainaut.

NOTICE

SUR LES

IBIS FALCINELLUS *Temm.*

ET

ELANUS MELANOPTERUS *Leach.*

PAR

A. THIELENS.



MONS,

Imprimerie DEQUESNE-MASQUILLIER, Grand'Rue, 25.

1869.

NOTICE

SUR LES

IBIS FALCINELLUS *Temm.*

ET

ELANUS MELANOPTERUS *Leach.*

PAR

A. THIELENS.

Notre collection ornithologique s'est enrichie de deux oiseaux tellement rares pour la Faune de Belgique, que nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérêt d'en signaler la présence en notre pays , et d'en faire l'objet d'une courte notice.

Tirlemont, 15 octobre 1868.

IBIS FALCINELLUS.

Temm. T. II, p. 308.

- GOULD. T. IV pl. 301.
NAUM. T. VIII. pl. 219.
DEGL. T. II p. 161.
THIEN pl. LXVIII fig. 4.
DE SELYS-LONGCH. Faune Belge n.° 217.
DUBOIS Ois de Belg. p. 196.
MALH. Faune Sicile p. 178.
SAVI Ornitholog. Toscana T. II p. 327.
V. D. MUHLE Ornith. Griechenlands n° 250.
MALH. Ois. d'Algérie p. 20.

Synonymie.

- Tantalus falcinellus* LINNÉ.
» *igneus* et *viridis* GMEL.
» *longirostris* BREHM.
Numenius viridis et *castaneus* BRISS.
» *igneus* LATH.
Plegadis falcinellus KAUP.
Ibis viridis VIEIL.

Noms français.

- | | |
|------------------|-------------------|
| Ibis falcinelle. | Courlis d'Italie. |
| Ibis noir | Courlis marron. |
| Courlis vert. | Courlis brillant. |

Cet oiseau, qui appartient à l'ordre des Echassiers et à la famille des Numénidés, habite l'Europe, l'Asie, quelquefois le Nord de l'Afrique et plus fréquemment l'Égypte; il se montre fort rarement en Belgique.

Jusqu'à ce jour deux exemplaires seulement ont été tués dans notre pays, l'un en 1848 près de Grez-Doiceau (Brabant) par le prince Guil. de Looz, l'autre en 1854 près de Namur.

L'Ibis fait son apparition en Europe vers les mois d'avril ou de mai, il émigre en septembre.

Il vit en Société, mais dès qu'un couple est apparié, il reste uni jusqu'à ce qu'une circonstance fâcheuse vienne enlever un des époux.

A l'époque de leur émigration, ces oiseaux se réunissent en bandes nombreuses et voyagent toujours pendant la journée; il est fort curieux de voir les nombreuses sinuosités qu'ils décrivent dans l'air.

Ils vivent dans le voisinage des rivières, des marais et des bords de la mer; ils savent en cas de besoin fort bien nager.

Les Ibis nichent sur des arbres élevés, quelquefois cependant au milieu des broussailles; la ponte consiste en 2 ou 3 œufs blanchâtres; ces oiseaux qui ont le caractère timide et méfiant se nourrissent de poissons, de mollusques, de vers, d'insectes et même de grenouilles.

Caractères généraux.

Bec très-long, arqué, sillonné dans toute son étendue, presque carré à son origine, arrondi, obtus et lisse à sa pointe.

Narines basales, petites, se prolongeant dans le sillon qui s'étend de la base au bout du bec.

Tête et lorums en partie nus.

Ailes longues, suraiguës.

Queue courte et rectiligne.

Tarse de moyenne longueur; doigts réunis par une membrane jusqu'à la 1^{re} articulation; le pouce appuyant presque entièrement à terre.

Caractères spécifiques.

Tête d'un marron-noirâtre, à reflets bronzés et pourprés.

Corps d'un roux-pourpré avec le dessus du dos d'un vert foncé et violet.

Cou, poitrine et parties inférieures d'un brun foncé.

Bec noir verdâtre à extrémité brune.

Aréole des yeux verte, entourée de gris.

Pieds d'un brun-verdâtre.

Taille 62 centimètres environ.

Les jeunes ont le dos, le manteau la poitrine, la partie inférieure du cou le ventre et les cuisses d'un brun cendré, les plumes de la tête de la gorge et du cou brunes rayées de noir et bordées de blanc.

L'Exemplaire que nous possédons, a été tiré le 6 octobre dernier, par le Lieutenant Baron Arthur de Heusch, qui a bien voulu nous en faire cadeau.

Il l'a abattu au bord d'un ruisseau dans une prairie située hors la Porte de Maestricht à Tirlemont.

ELANUS MELANOPTERUS.

Leach.

- GOULD, Birds of Europe T. I. pl. 31.
BREHM, Handb p. 78.
GLOG Handb. T. I, p. 85.
SCHLEG. Revue p. 11.
KAISS. et BLAS n° 16.
DEGL. Ornith. T. I p. 68.
SCHLEGEL et SUS. T. Ip. 99 pl. 32.
DE SELYS-LONGCH. Faune Belge n° 16.
DUBOIS, Ois. de Belg. p. 9.
MALH. Faune Sicile p. 35.
VAN DER MULHLE Vg. Griechenlands n° 13.
RUPPELL Vg. Nord-Est-Africa's n° 35.
V. MULLER Ornith. Africa's p. 14.

Synonymie.

Falco Melanopterus DANDIN.

» *perspicillatus* LICHTENSTEIN.

» *Sonninensis* LATH.

Elanoïdes cæsius VIEILLOT.

Elanos cæsius SAVIG; LEVAIL. Ois d'Afrique. pl. 36 et 37.

Elanion Blac TEMM. Man T. III p. 33.

Noms français.

Elanion mélanoptère.

Faucon mélanoptère.

Blac.

Cet oiseau, qui appartient à l'ordre des oiseaux de proie et à la famille des Faucons, habite Java, le cap de Bonne-Espérance et surtout l'Afrique où il est très-commun.

Il ne vient qu'accidentellement en Europe où il est sans doute

de passage, en Belgique il est excessivement rare : en effet jusqu'à ce jour croyons-nous, un seul exemplaire a été tiré près de Boitfort (Brabant) en mai 1847.

Les Elanions de même d'ailleurs que tous les oiseaux de proie se distinguent des autres oiseaux par leurs formes élégantes, leur noble maintien, leur courage et leur grande audace. Ils ont le vol très-élevé, léger, élégant et flottent fréquemment en décrivant de grands cercles. Ils ont la vue très-étendue, très-nette et très-vive.

Ils font entendre un cri des plus perçants, surtout lorsqu'ils volent.

Les Elanions habitent toujours par couples solitaires et se tiennent habituellement sur les grands arbres, quoique parfois aussi, on les rencontre au bord des marais.

Leur nourriture consiste en insectes et sauterelles, parfois en petits mammifères et rarement en oiseaux quoiqu'ils poursuivent fréquemment les Pies-Grièches qui semblent être leurs plus mortels ennemis.

Ils attaquent et saisissent leur victime avec les serres, se réservant le bec pour frapper ; leur caractère est cruel ; ils sont très-farouches et très difficiles à approcher. Ils semblent même n'avoir que peu d'affection pour leurs petits, car à peine ceux-ci ont-ils la force de voler qu'ils sont chassés du nid et forcés de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Cette espèce établit son aire entre les branches des arbres ; celle-ci est très spacieuse, très évasée, composée de branchâges et tapissée à l'intérieur de mousse et de plumes. La ponte consiste en 4 ou 5 œufs blancs.

Caractères génériques.

Bec court, élargi en bas, comprimé jusqu'à la pointe, à arêtes vives, à bords mandibulaires, munis d'un feston très-fort et aigu.

Narines ovalaires ; cire étroite.

Ailes longues, plus longues que la queue, à deuxième remige la plus longue.

Queue longue, arrondie aux côtés, découpée vers le centre.

Tarses plus courts que le doigt médian robustes à moitié emplumés, entièrement réticulés.

Doigts allongés, gros, réticulés, l'externe plus court que l'interne.

Ongles recourbés, grands, pointus, celui du pouce plus fort.

Caractères spécifiques.

Parties supérieures du corps roussâtres, variées de noir et de cendré sur les ailes ; parties inférieures blanches.

Orbites entourés d'un cercle noirâtre avec une tâche noire en avant des yeux. Queue légèrement échancrée, les deux pennes du milieu cendrées, les autres blanches, à bout terminal cendré et à barbe intérieure d'un blanc pâle.

Couverture des ailes en grande partie d'un beau noir.

Bec et ongles noirs.

Iris et pieds de couleur orange.

Les jeunes diffèrent essentiellement des adultes ; ils sont d'un brun cendré terne, strié de noir et de blanc-roussâtre. — Taille 35 centimètres.

L'exemplaire que nous possédons est un magnifique mâle, nous l'avons tiré nous-même en juin dernier dans la grande sapinière située près du marais de Beggynendyck près Aerschot.
