Geologische Bundesanstalt
Kartensammlung

ARCHIV

Recente Schuttbildungen.
Postglaciales Diluvium.
Glacial Diluvium.
Praeglaciales Diluvium.
Schio Schichten.
Oligocäner u. eocäner Flysch.
Basalt.
Nummuliten Sch.
Scaglia.—Hippuritenkalk.
Biancone.—Rothe Neoc. Mergel.
Oberer u. mittl. Jura.
Lias.
Dachstein Kalk.
Dolomit der Raibler Sch.
Cassianer Dolomit.
Wengener Dolomit.
Augitporphyr Laven.
Melaphyr.
Buchensteiner Sch.— Dolomit.
Oberer Muschelkalk
Unterer Muschelkalk.
Werfener Sch.
Bellerophon Sch.
Grödener Sandstein.
Quarzporphyr.
Verrucano.
Krystallinische Schiefer.

Maßstab 1:75000

Maßstab 1 Zoll = 250 Klafter oder 1000 Meter

Edm. von Mojsisovics, Dolomitriffe von Südtirol und Venetien.

Blatt VI.



Jura.

- Oberer und mittlerer Jura.
- Unterer Jura (Lias.)

Trias.

1. Rhätische Stufe.
2. Karnische Stufe.
   - Dachstein Schichten, Kalk und Dolomit, (Haupt Dolomit.)
   - Raibler Schichten. — Dolomitfacies.
   - Cassianer Schichten. — Riffacies (Dolomit u. Kalk.)
3. Norische Stufe.
   - Wengener Schichten. — Riffacies (Dolomit u. Kalk.)
   - Submarine Augitporphyr Laven und Tuffe. — Dickschichtige Augitporphyr Tuffe.
   - Buchensteiner Schichten und Pietra verde. — Riffacies (Dolomit u. Kalk.)
4. Muschelkalk Stufe.
   - Oberer Muschelkalk, Riffacies (Dolomit u. Kalk, Mendola Dolomit.)
   - Unterer Muschelkalk. — Dolomitfacies.
5. Buntsandstein.
   - Werfener Schichten.
   - Bellerophon Schichten und Gyps.
   - Grödener Sandstein.

Hauptporphyrmassive: Syenit und Diorit. Augitfels und Gabbro. Turmalingranit. Orthoklasporphyr. Melaphyr und Augitporph.

Permische Stufe.

- Quarzporphyr u. Quarzporphyritdecken, mit untergeordneten Tuffen und Sandsteinen. — Granit. Hornblendegranit. Quarzporphyr. Diorit.
- Verrucano Conglomerate und Sandsteine.

Krystallinische Schiefer, vorherrschend Quarzphyllit.

Lith. Anst. v. F. Köke in Wien.

Alfred Hölder, k. k. Hof- u. Universitäts Buchhändler in Wien.