

sammlung des Saales IV eine Kollektion von Kreidefossilien aus der Gegend von Böhmischn-Trübau, so wie er auch größere Formatstücke von Wollastonit und Arsenopyrit aus der Gegend von Wolin in Böhmen spendete.

Von sonstigen Zuwendungen für das Museum sei erwähnt, daß Herr Bergrat V. Wenhard, Vorstand der Saline von Ebensee, eine Sammlung von Fossilien des Plassenkalkes aus dem Steinbruch von Karbuchmühle uns übermittelte (vgl. oben pag. 11) und daß der Arzt Herr Dr. Friedrich Polack uns einen wegen des Fundortes wichtigen Ammoniten *Perisphinctes cf. haliarchus Neum.* mit einem *Aptychus* aus den Acanthiusschichten des Kardinalwaldes bei Gießhübel unweit Wien freundlichst überließ. Herrn Direktor Hugo Höfer von Heimhalt verdanken wir ein interessantes Stück stalaktitischen Schwefelkieses aus einer Kluft des Adolf-Flözes von Polnisch-Ostrau. Überdies gedenke ich einer Zusendung des Herrn Alois Czerny in Mährisch-Trübau, bestehend aus einer prächtigen Stufe eines fossilen Harzes (Walchovit) aus dem Cenoman des Schönhengstgebirges und einigen anderen interessanten Vorkommnissen aus der Gegend von Petersdorf bei Mährisch-Trübau, welche anzudeuten scheinen, daß dort am Kirchnberg und bei der sogenannten Abladung permischer Sandstein in kleinen Partien auftritt, die bei der seinerzeitigen Aufnahme jenes Gebietes übersehen wurden.

Die Besprechung unserer Sammlungen gibt mir nunmehr Veranlassung, einer sehr nützlichen Arbeit zu gedenken, der sich einer unserer Herren freiwillig unterzogen hat.

Dr. Waagen hat nämlich die durch den Ausfall der diesjährigen Aufnahmestätigkeit im Herbst erübrigte Zeit dazu benützt, um die seinerzeit begonnene Katalogisierung der paläontologischen Originalstücke unserer Sammlung (vgl. Jahresbericht für 1907 und 1911) weiterzuführen und es erscheinen derzeit die Originale zu folgenden paläontologischen Arbeiten registriert:

- Arthaber, G. A. von: Die Cephalopodenfauna der Reifflinger Kalke. 6 Originale.
 — Die alpine Trias des Mediterrangebietes. 90 Originale.
 Bittner, A.: Die Brachiopoden des vizent. Tertiärgebirges. 9 Originale.
 — Beiträge zur Kenntnis tertiärer Brachyurenfaunen. 6 Originale.
 — Neue Beiträge zur Kenntnis der Brachyurenfauna des Alttertiärs von Vicenza und Verona. 6 Originale.
 — Beiträge zur Kenntnis der alttertiären Echinidenfaunen der Südalpen. 38 Originale.
 — *Micropsis Veronensis*, ein neuer Echinide des oberitalienischen Eocäns. 1 Original.
 — Über *Phymatocarcinus speciosus Reuss*. 1 Original.
 — Die tertiären Ablagerungen von Trifail und Sagor. 26 Originale.
 — Eine triadische *Conularia*. 1 Original.
 — Über zwei ungenügend bekannte brachyure Crustaceen des vicentischen Eocäns. 5 Originale.

- Bittner, A.: *Orygoceras* aus den sarmatischen Schichten von Wiesen. 1 Original.
- Triaspetrefakten von Balia in Kleinasien. 3 Originale.
 - Neue Arten aus der Trias von Balia in Kleinasien. 2 Originale.
 - Neue Brachiopoden und eine neue *Halobia* der Trias von Balia in Kleinasien. 11 Originale.
 - Beiträge zur Paläontologie, insbesondere der triadischen Ablagerungen zentralasiatischer Hochgebirge. 42 Originale.
 - Versteinerungen aus den Triasablagerungen des Südussurgebietes. 2 Originale.
 - Trias-Brachiopoden und Lamellibranchiaten. 17 Originale.
 - Brachiopoden der alpinen Trias. 820 Originale.
 - Brachiopoden der alpinen Trias. Nachtrag I. 66 Originale.
 - Über die Gattung *Rhynchonellina Gemm.* 77 Originale.
 - *Rhynchonellina Geyeri*, ein neuer Brachiopode aus den Gailtaler Alpen. 17 Originale.
 - Über Koninckiniden des alpinen Lias. 13 Originale.
 - Neue Koninckiniden des alpinen Lias. 13 Originale.
 - Über zwei neue Brachiopoden aus dem Lias und der Gosaukreide von Salzburg. 24 Originale.
 - Brachiopoden und Lamellibranchiaten aus der Trias von Bosnien, Dalmatien und Venetien. 76 Originale.
 - Lamellibranchiaten der alpinen Trias. 387 Originale.
 - Über die triadische Lamellibranchiatengattung *Mysidioptera Sal.* und deren Beziehungen zu paläozoischen Gattungen. 8 Originale.
 - Lamellibranchiaten aus der Trias von Hudiklanec nächst Loitsch in Krain. 14 Originale.
 - Über *Pseudomonotis Telleri* und verwandte Arten der unteren Trias. 33 Originale.
- Eichenbaum, Jos.: Die Brachiopoden von Smokovac bei Risano in Dalmatien. 15 Originale.
- Ettingshausen, C. v.: Über Paläobromelia, ein neues fossiles Pflanzengeschlecht. 4 Originale.
- Beitrag zur näheren Kenntnis der Flora der Wealdenperiode. 57 Originale.
 - Begründung einiger neuen oder nicht genau bekannten Arten der Lias- und der Oolithformation. 15 Originale.
 - Die Steinkohlenflora von Strakonitz in Böhmen. 28 Originale.
 - Fossile Pflanzenreste aus dem trachytischen Sandstein von Heiligenkreuz bei Kremnitz. 33 Originale.
- Frauscher, K. F.: Das Untereocän der Nordalpen und seine Fauna. 8 Originale.
- Friedberg, W.: Mollusca miocaenica Poloniae, I. Teil. Gasteropoda. 2 Originale.
- Fuchs, Th.: Beitrag zur Kenntnis der Konchylienfauna des vicentinischen Tertiärgebirges. I. Die obere Schichtgruppe oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. 11 Originale.
- Geyer, G.: Über liasische Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt. 108 Originale.

- Geyer, G.: Über die liasischen Brachiopoden des Hierlatz bei Hallstatt. 247 Originale.
- Griesbach, K.: Der Jura von St. Veit bei Wien. 1 Original.
- Hauer, F. v.: Die Cephalopoden des Salzkammergutes aus der Sammlung Seiner Durchlaucht des Fürsten Metternich. 5 Originale.
- Über die Cephalopoden des Muschelmarmors von Bleiberg in Kärnten. 2 Originale.
- Die Fossilien von Korod in Siebenbürgen. 3 Originale.
- Über die von Bergrat Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. 55 Originale.
- Beiträge zur Kenntnis der Heterophyllen der österreichischen Alpen. 9 Originale.
- Beiträge zur Kenntnis der Capricornier der österreichischen Alpen. 3 Originale.
- Über einige unsymmetrische Ammoniten. 6 Originale.
- *Caprina Partschii* aus den Gosauschichten. 4 Originale.
- Paläontologische Notizen. 14 Originale.
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Raibler Schichten. 45 Originale.
- Über die Cephalopoden der Gosauschichten. 8 Originale.
- Über die Petrefakten der Kreideformation des Bakonyerwaldes. 10 Originale.
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden der Hallstätter Schichten. 10 Originale.
- Über die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen. 64 Originale.
- Die Cephalopoden aus der unteren Trias der Alpen. 6 Originale.
- Neue Cephalopoden aus den Gosagebilden der Alpen. 5 Originale.
- Hilber, V.: Neue und wenig bekannte Konchylien aus dem ostgalizischen Miocän. 103 Originale.
- Hochstetter, E. W. v.: Die Klippe von St. Veit bei Wien. 1 Original.
- Hörnes, R.: Tertiärstudien (I. Die Fauna der sarmatischen Ablagerungen von Kischineff in Bessarabien. II. Die sarmatische Fauna von Jenikale an der Kertschstraße. III. Die Valenciennesia-Schichten von Taman an der Kertschstraße). IV. Die Fauna der eisen-schüssigen Tone (Congerienschichten) an der Kertschstraße. V. Ein Beitrag zur Kenntnis der Neogenfauna von Südsteiermark und Kroatien. VI. Valenciennesia-Schichten aus dem Banat. 85 Originale.
- Die Fauna des Schliers von Otnang. 93 Originale.
- *Anthracotherium magnum* aus den Kohlenablagerungen von Trifail. 3 Originale.
- Über die Gastropoden und Azephalen der Hallstätter Schichten. 1 Original.
- Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien. 13 Originale.
- Hörnes, R. & M. A u i n g e r.: Die Gastropoden der Meeresablagerungen der ersten und zweiten Mediterranstufe in der Öst.-Ung. Monarchie. 26 Originale.
- Jahn, Jar. J.: Neue Tierreste aus dem böhmischen Silur. 4 Originale.
- Kerner, F. v.: Die Karbonflora des Steinacher Joches. 20 Originale.

- Kittl, E.: Die Miocänablagerungen des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers und deren Faunen. 9 Originale.
- Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpiner Trias. 156 Originale.
- Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weißen Riffkalken Südtirols. 1 Original.
- Die Gastropoden der Esinokalke nebst einer Revision der Gastropoden der Marmolatakalke. 80 Originale.
- Koken, E.: Die Gastropoden der Trias um Hallstatt. 145 Originale.
- Die Gastropoden der Schichten mit *Arcestes Studeri*. 5 Originale.
- Kornhuber, A.: Über einen neuen fossilen Saurier aus Lesina. 1 Original.
- Kramberger, D.: Die fossilen Fische von Wurzenegg bei Praßberg in Steiermark. 6 Originale.
- Kudernatsch, J.: Die Ammoniten von Swinitza. 18 Originale.
- Laube, G.: Die Echiniden der österr.-ungar. Tertiärablagerungen. 3 Originale.
- Die Bivalven des braunen Jura von Balin. 55 Originale.
- Die Echinodermen des braunen Jura von Balin. 8 Originale.
- Die Gastropoden des braunen Jura von Balin. 2 Originale.
- Die Fauna der Schichten von St. Cassian. 587 Originale.
- Mayr, Gust. L.: Vorläufige Studien über die Radoboj-Formiciden. 12 Originale.
- Mojšisovič, E. v.: Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna des alpinen Muschelkalkes. 14 Originale.
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna der oenischen Gruppe. 4 Originale.
- Über das Belemnitidengeschlecht *Aulacoceras Fr. v. Hauer*. 33 Originale.
- Über einige Triasversteinerungen aus den Südalpen. 6 Originale.
- Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. 1726 Originale.
- Die Cephalopoden der mediterranen Triasprovinz. 553 Originale.
- Neumayr, M.: Beiträge zur Kenntnis fossiler Binnenfaunen. 71 Originale.
- Über einige neue oder wenig bekannte Cephalopoden der Makrozephalenschichten. 4 Originale.
- Jurastudien. I. 8 Originale.
- Jurastudien. II. Folge. 29 Originale.
- Die Fauna der Schichten mit *Aspidoceras acanthicum*. 39 Originale.
- Zur Kenntnis der Fauna des untersten Lias in den Nordalpen. 10 Originale.
- Tertiäre Binnenmollusken aus Bosnien und der Herzegowina. 16 Originale.
- Morphologische Studien über fossile Echinodermen. 1 Original.
- Neumayr, M. u. C. M. Paul: Die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens und deren Fauna. 176 Originale.

- Paul, K. M.: Beiträge zur Kenntnis der Congerierschichte Westslawoniens und deren Lignitführung. 1 Original.
- Peters, K.: Die Nerineen des oberen Jura in Österreich. 44 Originale.
— Über den Lias von Fünfkirchen. 3 Originale.
— Das Halitheriumskelett von Hainburg. 4 Originale.
— Schildkrötenreste aus den österr. Tertiärablagerungen. 2 Originale.
— Beiträge zur Kenntnis der Schildkrötenreste aus den österr. Tertiärablagerungen. 2 Originale.
— Zur Kenntnis der Wirbeltierreste aus dem Miocän von Eibiswald.
I. Die Schildkrötenreste. 3 Originale.
II. *Amphicyon. Viverra-Hyotherium*. 29 Originale.
III. *Rhinoceros, Anchitherium*. 20 Originale.
— Die Aptychen der österreichischen Neocomien- und oberen Juraschichten. 1 Original.
- Petrascheck, W.: Über Inoceramen aus der Gosau und dem Flysch der Nordalpen. 2 Originale.
- Polifka, S.: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Schlerndolomits. 15 Originale.
- Redtenbacher, A.: Die Cephalopodenfauna der Gosauschichten in den nordöstl. Alpen. 41 Originale.
- Schellwien, E.: Die Fauna der Trogkofelschichten in den Karischen Alpen und Karawanken. 181 Originale.
- Schlönbach, U.: Die Brachiopoden der böhmischen Kreide. 1 Original.
— Kleine paläontologische Mitteilungen. V. 3 Originale.
— Kleine paläontologische Mitteilungen. VI. 2 Originale.
- Schmid, Jos.: Über die Fossilien des Vinicaberges bei Karlstadt in Kroatien. 11 Originale.
- Stache, G.: Beiträge zur Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. 135 Originale.
- Stoliczka, Ferd.: Über die Gastropoden und Acephalen der Hierlatzschichten. 68 Originale.
- Stur, D.: Das Isonzotal von Flitsch abwärts bis Görz, die Umgebung von Wippach, Adelsberg, Planina und die Wochein. 2 Originale.
— Über zwei neue Farne aus den Sotzkaschichten von Möttöning in Krain. 2 Originale.
- Suess, E.: Über die Brachiopoden der Hallstätter Schichten. 13 Originale.
- Tausch, L.: Über die Fauna der nicht marinen Ablagerungen der oberen Kreide des Csingertales bei Ajka im Bakony und über einige Konchylien der Gosaumergel von Aigen bei Salzburg. 126 Originale.
— Über die Bivalvengattung *Conchodus* und *Conchodus Schwageri n. f.* aus der obersten Trias der Nordalpen. 5 Originale.
— Zur Kenntnis der Fauna der „Grauen Kalke“ der Südalpen. 50 Originale.

- Tietze, E.: Geologische und paläontologische Mitteilungen aus dem südlichen Teile des Banater Gebirgsstockes. 67 Originale.
- Trauth, F.: Die Grestner Schichten der österreichischen Voralpen und ihre Fauna. 29 Originale.
- Uhlig, V.: Beiträge zur Kenntnis der Juraformation in den karpath. Klippen. 13 Originale.
- Über die Fauna des roten Kollowaykalkes der pienninischen Klippe Babierzowka bei Neumarkt in Westgalizien. 51 Originale.
 - Über die liasische Brachiopodenfauna von Sospirolo bei Belluno. 53 Originale.
 - Zur Kenntnis der Cephalopoden der Roßfeldschichten. 6 Originale.
 - Über neokome Fossilien von Gardenazza in Südtirol. 3 Originale.
 - Über eine unterliasische Fauna aus der Bukowina. 8 Originale.
 - Über eine Mikrofauna aus dem Alttertiär der westgalizischen Karpathen. 54 Originale.
 - Die Cephalopoden der Warnsdorfer Schichten. 77 Originale.
- Unger, F.: Die fossile Flora von Sotzka. 176 Originale.
- Vacek, M.: Über Vorarlberger Kreide. 5 Originale.
- Über die Fauna der Oolithe von Kap S. Vigilio. 262 Originale.
- Wähner, F.: Beiträge zur Kenntnis der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. 79 Originale.
- Wöhrmann, S. Freih. v.: Die Fauna der sogenannten Cardita- und Raiblerschichten in den Nordtiroler und Bayrischen Alpen. 18 Originale.
- Woldrich, Joh. Nep.: Beiträge zur Fauna der Breccien und anderen Diluvialgebilde Österreichs. 27 Originale.
- Zeise, O.: Die Spongien der Stramberger Schichten. 9 Originale.
- Zekeli, F.: Die Gastropoden der Gosaugebilde. 220 Originale.
- Zittel, K. A.: Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordöstlichen Alpen. 210 Originale.

Es erscheinen somit im Autorenkatalog zu 141 Publikationen von 50 verschiedenen Autoren 8954 Originalstücke verzeichnet gegenüber den im Jahresberichte für 1911 ausgewiesenen 7741 Stücken.

Zu den Sammlungen unseres Instituts muß jedenfalls auch das zurzeit unter der Leitung des Herrn Dr. Petrascheck stehende Bohrarhiv gerechnet werden, über welches diesmal einige Worte gesagt werden mögen, wenn auch gerade heuer der Zuwachs speziell dieser Sammlung gering war, schon weil nur sehr wenige Reisen in jenem Kohlenrevier gemacht wurden, in dem die meisten tiefen Bohrungen vorgenommen werden. In der im Jahre 1906 angelegten Sammlung wurden bis jetzt 267 vollständige Profile, von denen 124 durch Proben belegt sind und die eine Gesamttiefe von über 133.000 m aufweisen, registriert. Das Archiv ist zum größten Teil nach Kartenblättern geordnet, wobei die Situationen auf Spezialkartenblättern eingetragen werden. Die Proben werden nach der Reihenfolge ihres Einganges aufgestapelt. Es entfallen auf Böhmen 182 Profile mit