

Binnenconchylien aus dem Obermiocän des Pfänders bei Bregenz am Bodensee.

Von

Carlo H. Jooss, Stuttgart.

Die Anregung zu der folgenden kleinen Arbeit verdanke ich Herrn Professor F. Kinkelin in Frankfurt a. M., welcher mir in liebenswürdiger Weise seine sämtlichen Funde aus dem Obermiocän des Pfänders zur Verfügung stellte. Die Fossilien stammen aus dem weichen, mergeligen Sandstein, der am westlichen Abhange des Pfänders unterhalb der Ruggburg in grösserer Mächtigkeit ansteht, und sind verhältnismässig gut erhalten, was bei Conchylien aus dieser fossilarmen Schicht sonst selten der Fall ist. In der Mehrzahl sind darunter die gewöhnlichen Vertreter des Obermiocäns: *Tachea sylvana* (v. Kl.), *Chilostoma inflexa* (v. Kl.), *Melania escheri* (Brogn.) etc., doch liegen auch seltenere Arten vor, die mich hauptsächlich zu nachstehender Arbeit veranlassten. Sämtliche Arten wurden bereits a. a. O. von F. Kinkelin flüchtig erwähnt, und indem ich im Uebrigen auf diese Arbeit verweise, möchte ich nun zur Aufzählung der einzelnen Arten schreiten, zugleich aber auch Herrn Professor Kinkelin an dieser Stelle nochmals bestens danken*).

Es fanden sich folgende Arten:

1. *Oleacina (Boltenia) eburnea* v. Klein sp.

1853. *Achatina eburnea* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. IX S. 213, Taf. V, Fig. 10.

1874. *Oleacina* „ „ sp. Sandberger, Vorwelt, S. 606, Taf. XXIX, Fig. 31 bis 31 b.

*) Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Heft XXXVI, 1907, S. 11.

1891. *Oleacina eburnea* Klein; sp. Maillard, Mém. de la soc. paléontol. suisse, vol. XVIII pg. 6, pl. I, fig. 5—7.

Von dieser hübschen und zierlichen Art fand ich ein Exemplar im Innern einer zufällig zerbrochenen grösseren Helicee. Es erreicht bei 5 Umgängen 11 mm Höhe und 3,5 mm grösste Breite. Ich konnte dasselbe mit Exemplaren aus den gleichalten Schichten Württembergs (Andelfinger Berg unweit Riedlingen a. D. 1 Ex., Bechingen bei Zwiefaltendorf 1 Ex., Mörsingen bei Zwiefalten 2 Ex.) und der Schweiz (le Locle Ct. de Neuchâtel 1 Ex.) vergleichen und fand es bis auf geringe Grössenunterschiede mit jenen vollkommen übereinstimmend.

2. *Archaeozonites costatus* Sandberger.

1874. *Arch. costatus* Sandberger; Vorwelt, S. 604.

1885. " " " Clessin, Malakozool. Blätter N. F. Bd. VIII S. 76.

1892. " " " " Ber. d. naturwiss. Ver. zu Regensburg, IV. Heft S. 7.

1907. " " " " Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees, Heft XXXVI S. 11.

Diese Art, welche ich an anderen Orten näher zu beschreiben gedenke, liegt mir in einem Bruchstück von $3\frac{1}{2}$ Windungen vor, dessen Erhaltungszustand zu wünschen übrig lässt. Aus dem Obermiocän Württembergs kenne ich *A. costatus* von Mörsingen bei Zwiefalten, Stubersheim bei Geislingen und Laichingen. Aus den gleichalten Schichten Baierns ist er bekannt von Undorf bei Regensburg, Häder und Kutzenhausen bei Dinkelscherben, sowie vom Gutzgrieder Graben am Peissenberg. Im Obermiocän der Schweiz scheint er eigentümlicherweise nicht vorzukommen, wenigstens zitiert ihn Maillard in seiner Arbeit nicht.

3. *Klikia osculum* Thomä, var. *giengensis* Krauss.

1846. *Helix giengensis* Krauss; Klein, Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. II S. 69, Taf. I, Fig. 9.
1853. „ „ „ „ Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. IX S. 209.
1854. „ „ „ Gobanz, Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien, math. natw. Bd. XIII S. 193.
1874. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Sandberger, Vorwelt S. 585, Taf. XXIX, Fig. 4—4 b.
1877. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Clessin, Regensburger Korr.-Blatt S. 36.
1885. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Malakozool. Blätter N. F. Bd. VIII S. 77.
1891. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Maillard, Mém. de la soc. paléontol. suisse, vol. XVIII pg. 69, pl. I, fig. 12—12 b.
1891. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä); Penecke, Zeitschr. d. d. geol. Ges., Bd. XLIII S. 359.
1892. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Clessin, Ber. d. naturwiss. Ver. zu Regensburg, IV. Heft S. 7.
1907. *H. (Gonostoma) osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.); Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. des Bodensees, Heft XXXVI S. 11.

Das einzige, etwas zerdrückte Exemplar dieser sonst im Obermiocän verbreiteten und häufigen Art zeigt bei $5\frac{1}{2}$ Umgängen 10 mm Durchmesser und 6 mm Höhe. Die Mündung weisst 5 mm Durchmesser und 4 mm Höhe.

4. *Tachea sylvana* v. Klein.

1848. *Helix sylvana* Klein; Dunker, Palaeontographica, Bd. I
S. 163, Taf. XXXI, Fig. 3—5.
1853. „ „ „ Württemb. naturwiss. Jahreshefte,
Bd. IX S. 205, Taf. V, Fig. 2.
1874. „ (*Macularia*) *sylvana* Klein; Sandberger, Vorwelt,
S. 592, Taf. XXIX,
Fig. 13—13 a, b, c.
1877. „ „ „ „ Clessin, Regensburger
Korr.-Blatt S. 36.
1885. „ „ „ „ Clessin, Malakozool.
Blätter N. F. Bd. VIII
S. 78.
1891. „ „ „ „ Maillard, Mém. de la
soc. paléontol. suisse,
vol. XVIII pg. 36,
pl. III, fig. 6—8.
1892. „ „ „ „ Clessin, Ber. d. natur-
wiss. Ver. zu Regens-
burg, IV. Heft S. 7.
1907. „ (*Pentataenia*) „ „ Kinkelin, Schriften d.
Ver. f. Gesch. d. Bo-
densees, Heft XXXVI
S. 11.

Von dieser als Leitfossil charakteristischen Art liegen zahlreiche Exemplare vor, unter denen einzelne sogar noch deutlich eine 3—4fache Bänderung erkennen lassen. Die Grössenverhältnisse schwanken zwischen 16—18 mm Höhe und 19—21 mm Breite bei $4\frac{1}{2}$ —5 Umgängen. Durchmesser der Mündung 9—10 mm, Höhe derselben $7-8\frac{1}{2}$ mm.

5. *Chilostoma inflexa* v. Klein.


1846. *Helix inflexa* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte,
Bd. II S. 71, Taf. I, Fig. 12.

1853. *Helix inflexa* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte,
Bd. IX S. 208.
1854. " " Gobanz, Sitzungsber. d. k. k. Akad. d.
Wiss. zu Wien, math. natw. Kl.
Bd. XIII S. 192.
1874. " (*Campylaea*) *inflexa* Klein; Sandberger, Vorwelt,
S. 589, Taf. XXIX,
Fig. 8—8 b.
1877. " " " " Clessin, Regensburger
Korr.-Blatt S. 36.
1885. " " " " Clessin, Malakozool,
Blätter N. F. Bd. VIII
S. 78.
1891. " " " " Maillard, Mém. de la
soc. paléontol. suisse,
vol. XVIII pag. 24.
pl. II. fig. 9—9 d.
1891. " " " " Penecke, Zeitschr. d.
d. geol. Ges., Bd. XLIII
S. 562.
1892. " " " " Clessin, Ber. d. natur-
wiss. Ver. zu Regens-
burg, IV. Heft S. 7.
1907. " " " " Kinkelin, Schriften d.
Ver. f. Gesch. d. Bo-
densees, Heft XXXVI
S. 11.

Seltener als wie die vorige findet sich diese Art im Obermiocän des Pfänders. Ich besitze 4 guterhaltene Exemplare von 22—24 mm Durchmesser und 19—22 mm Höhe bei $4\frac{3}{4}$ — $5\frac{1}{2}$ Umgängen. Der Durchmesser der Mündung beträgt 10—13 mm, die Höhe derselben 9—12 mm. Die Art ist sonst als Leitfossil verbreitet und häufig im Obermiocän. Als grosse Seltenheit findet sie sich auch im

Untermiocän von Reun in Steyermark zusammen mit der ihr sehr nahestehenden *Ch. standfesti* (Penecke), die ihre Stammart zu sein scheint.

6. *Triptychia (Eutriptychia) helvetica* Mayer-Eymar.



Clausilia helvetica C. Mayer; in coll. polyt. helvet.

1874. „ (*Triptychia*) *helvetica* C. Mayer; Sandberger, Vorwelt, S. 598.
1877. „ „ „ „ Böttger, Palaeontographica N. F. Suppl. III S. 15.
1891. „ „ „ „ Maillard, Mém. de la soc. paléontol. suisse, vol. XVIII pg. 82, pl. IV, fig. 3—4.
1907. „ „ „ „ Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. des Bodensees, Heft XXXVIS.11.

Die grosse Schale ist von bauchig-spindelförmiger Gestalt mit stumpfer, sehr schwach knopfförmig verdickter Spitze und steilgeneigter, mit engem Nabelritze versehener Grundfläche. Sie besteht aus 16 mässig gewölbten, durch schmale seichte Nähte getrennten Umgängen, die im Alter nicht abgeworfen werden und von denen die 3 ersten glatt, die übrigen mit zahlreichen, groben, schwach bogigen Rippchen bedeckt sind, welche auf dem letzten in undeutlich ausgeprägte Bänder übergehen. Der abgerundete letzte Umgang erreicht nicht ganz ein Drittel der Gesamthöhe. Die birnförmige Mündung ist innen gelippt, oben mit langem spitzen Sinulus versehen und besitzt miteinander verbundene, verdickt umgeschlagene Ränder, von denen der linke abgerundet ist und der obere sich in S-förmigem Bogen ablöst. Die ziemlich schwach entwickelten Lamellen erreichen den Aussenrand nicht; die obere, beinahe senkrechte, verbindet sich mit der Spirallamelle, die untere und die Subcolumellarlamelle drehen sich, übereinandergestellt, nach oben. Prinzipal-, Mond- und Gaumenfalte fehlen.

Es liegen mir vom Pfänder mehrere, zum Teil recht gut erhaltene Exemplare vor, deren Grössenverhältnisse sind:

Höhe 48—52 mm, Breite 14—17 $\frac{1}{2}$ mm,

Mündungshöhe 13—14 mm, Mündungsbreite 7—8 mm.

Im Obermiocän Württembergs wurde diese Art bis jetzt beobachtet am Andelfinger Berg nahe Riedlingen, und an der Adelegg in Oberschwaben; in den gleichalten Schichten der Schweiz bei St. Gallen, Rosenberg bei St. Gallen, Katzenstebel (Kt. St. Gallen), Reuenthal (Kt. Zürich), Rüti, Dürnten, Hombrechtikon, Bäretschwyl, Baarburg (Kt. Zug), Bötzbberg (Kt. Aargau), Courfaivre und Sitzberg bei Wyd (Kt. Bern). Nach Sandberger soll *Tr. helvetica* endlich auch noch im Obermiocän von Laymont im südwestlichen Frankreich vorkommen.

Auf die Unterschiede zwischen dieser Art und der im Untermiocän von Acs an der Donau vorkommenden *Tr. limbata* hat Sandberger bereits a. a. O. hingewiesen. Lebende Verwandte fehlen wie überhaupt beim ganzen Genus.

Das seltene Vorkommen sowie der meist sehr schlechte Erhaltungszustand der einzelnen Exemplare haben bis jetzt eine genauere Charakterisierung dieser Art nicht erlaubt. Sandberger erwähnt sie nur flüchtig, Böttger kennt die Art überhaupt nicht; Maillard gibt zwar in seiner Monographie eine Beschreibung und Abbildung, doch lässt erstere an Ausführlichkeit, letztere an Deutlichkeit zu wünschen übrig.

7. *Triptychia (Eutriptychia) teutonica* n. sp.

Unter zahlreichen Fragmenten der vorhergehenden Art fand sich ein aus den 10 ersten Windungen bestehendes Bruchstück einer schlanken *Triptychia*, das sich nach sorgfältigen Vergleichen mit einer neuen Art identisch erwies, welche von mir bei Mörsingen in Württemberg gefunden wurde und unter dem Namen *Tr. teutonica* an anderen Orten beschrieben und abgebildet werden soll. Vorerst begnüge ich mich damit, auf das Vorkommen dieser neuen Art auch im Obermiocän des Pfänders kurz hinzuweisen.

8. *Pseudidyla mörsingensis* Sandberger.

1874. Claus. (*Pseudidyla*) mörsingensis Sandberger; Vorwelt' S. 598.

1877. Claus. (*Pseudidyla*) mörsingensis Sandberger; Böttger, Palaeontographica, N. F. Suppl. III S. 89, Taf. III, Fig. 32 a bis d.

1907. Claus. (*Pseudidyla*) mörsingensis Sandberger; Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees, Heft XXXVI S. 11.

Von dieser kleinen zierlichen Form fand ich ein Bruchstück, dem leider die Mündung fehlt. Ich besitze Ps.

mörsingensis sonst noch aus dem Obermiocän von Mörsingen bei Zwiefalten in Württemberg und le Locle (Ct. de Neuchâtel).

9. *Limnaeus (Limnus) dilatatus* Noulet; *forma juvenilis*.

1846. *Limnaeus ellipticus* Kurr; Klein, Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. II S. 83, Taf. II, Fig. 5 a und b.
1848. „ *pachygaster* Thomä; Dunker, Palaeontographica, Bd. I S. 160.
1854. „ *dilatatus* Noulet; Mém. sur les coqu. foss. d'eau douce du S. Ouest de la France, I ed. pg. 107. d'eau douce du S. Ouest de la France, I ed. pg. 107.
1864. „ „ „ le même II ed. pg. 167.
1864. „ „ „ Deshayes, descript. des anim. sans vert. t. II pg. 704, pl. XLIV, fig. 3-4.
1874. „ „ „ Sandberger, Vorwelt, S. 580, Taf. XXVIII, Fig. 24—24 a.
1881. „ „ „ Bourguignat, Biblioth. de l'école des hautes études, pg. 112, pl. VI, fig. 193.
1891. „ „ „ Maillard, Mém. de la soc. paléontol. suisse, vol. XVIII pg. 110, pl. VII, fig. 8—10^{1/2}.
1900. „ „ „ Miller, Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. LVI S. 400, Taf. VII, Fig. 20.
1907. „ „ „ Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees Heft XXXVI S. 11.

Mehrere unausgewachsene Exemplare dieser sonst im Obermiocän verbreiteten und häufigen Art liegen mir vom Pfänder vor.

10. *Melania escheri* Brogniart.
1822. *Melania escheri* Brogniart; Description géol. des env. de Paris, pg. 117.
1846. „ *turrita* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. II S. 81, Taf. II, Fig. 2.
1849. „ *escheri* Merian; Basler Verhandlungen, Bd. VIII S. 33.
1851. „ *wetzleri* Dunker; Palaeontographica, Bd. I S. 157, Taf. XXI, Fig. 1 und 2^{1/2}.
1852. „ *grossecostata* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. VIII S. 158, Taf. III, Fig. 10 und 11.
1853. „ *escheri* Greppin; Studer, Geologie der Schweiz, Bd. II S. 407.
1853. „ *grossecostata* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. IX S. 221, Taf. V, Fig. 19.
1856. 2 „ *escheri* (Brogn.), Hörnes, Die foss. Mollusken d. Wiener tert. Beckens, S. 602, Taf. XLIX, Fig. 16 a und b.
1874. „ *escheri* (Brogn.), Sandberger, Vorwelt, S. 572, Taf. XXVIII, Fig. 14 (var. *grossecostata*; Fig. 14 a typus; Fig. 15 b var. *rotundata*).

Das häufige Variieren dieser Art veranlasste seither eine grössere Anzahl Palaeontologen, verschiedene neue Arten und Varietäten abzutrennen, doch lässt sich bei grösserem Material aus verschiedenen Schichten eine wirkliche Grenze nicht ziehen, was schon Hörnes a. a. O. ganz richtig bemerkt. So besitze ich z. B. forma *rotundata* aus dem Unter- und Obermiocän Württembergs, ebenso die als Typus charakteristische grobrippige Form. Was mir vom Pfänder vorliegt, dürfte der forma *rotundata* entsprechen, doch ist der Erhaltungszustand der drei Bruchstücke von 2^{1/2}—4^{1/4} Umgängen ein ziemlich mangelhafter. Uebrigens werde ich auf diese Art a. a. O. näher eingehen.

Von den zehn im Obermiocän des Pfänders gefundenen Schneckenarten sind nur zwei Wasserbewohner, nämlich *Limnaeus dilatatus* und *Melania escheri*. Alle anderen sind Bewohner des Festlandes, die teils unter Laub und Moos, teils an Bäumen oder auf Felsen ihr Leben fristeten und wohl durch Regengüsse in den damaligen Obermiocänsee geschwemmt wurden. Darunter sind die gemeinsten, die als Leitfossilien des Obermiocäns bekannten Charakterschnecken *Tachea sylvana* und *Chilostoma inflexa*. Ihnen gesellt sich eine fleischfressende Art: *Archaeozonites costatus* bei, sowie zwei Triptychienarten, von denen besonders *Tr. helvetica* durch ihre Grösse und guten Erhaltungszustand auffällt. Die Schliessschnecken sind durch *Pseudidyla mör-singensis* vertreten.

Wenn es auch nur eine beschränkte Anzahl von Arten ist, die mir vom Pfänder vorliegen, so beweisen sie doch, dass der obermiocäne Sandstein, wie er im südlichen Teil der schweizerisch-schwäbischen Hochebene ansteht, doch nicht so fossilienarm ist, wie er allgemein bezeichnet wird, sondern bei genauerer Durchforschung wohl noch manches Interessante liefern dürfte.

Ueber *Physa acuta* Drap. und deren Vorkommen in Russland.

Von

W. A. Lindholm, Moskau.

Ueber das allmähliche Vordringen von *Physa acuta* Drap. nach Osten, deren ursprüngliche Heimat Südwesteuropa und Nordwestafrika sind, ist in letzter Zeit wiederholt berichtet worden. Für diese andauernde Ausdehnung des Verbreitungsgebietes sind in erster Linie die Aquarienliebhaberei und der Handel mit Süsswasserpflanzen verantwortlich zu machen. Auf diese Weise ist *Physa acuta*

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page 19]

— 19 —

Binnenconchylien aus dem Obermiocän des Pfänders bei
Bregenz am Bodensee.

Von

Carlo H. Jooss, Stuttgart.

Die Anregung zu der folgenden kleinen Arbeit ver-
danke ich Herrn Professor F. Kinkelin in Frankfurt a. M.,
welcher mir in liebenswürdiger Weise seine sämtlichen
Funde aus dem Obermiocän des Pfänders zur Verfügung
stellte. Die Fossilien stammen aus dem weichen, mergeligen
Sandstein, der am westlichen Abhänge des Pfänders unter-
halb der Ruggburg in grösserer Mächtigkeit ansteht, und
sind verhältnismässig gut erhalten, was bei Conchylien aus
dieser fossilarmen Schicht sonst selten der Fall ist. In der
Mehrzahl sind darunter die gewöhnlichen Vertreter des Ober-
miocäns : *Tachea sylvana* (v. Kl.), *Chilostoma inflexa* (v. Kl.),
Melania eschen (Brogn.) etc., doch liegen auch seltenere
Arten vor, die mich hauptsächlich zu nachstehender Arbeit
veranlassten. Sämtliche Arten wurden bereits a. a. O. von
F. Kinkelin flüchtig erwähnt, und indem ich im Uebrigen
auf diese Arbeit verweise, möchte ich nun zur Aufzählung
der einzelnen Arten schreiten, zugleich aber auch Herrn
Professor Kinkelin an dieser Stelle nochmals bestens danken*).

Es fanden sich folgende Arten:

1. *Oleacina* (*Boltenia*) *eburnea* v. Klein sp.

1853. *Achatina eburnea* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshefte, Bd. IX S. 213, Taf. V,
Fig. 10.

1874. *Oleacina* „ „ sp. Sandberger, Vorwelt,

S. 606, Taf. XXIX, Fig. 31

bis 31b.

*) Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Heft XXXVI,
1907, S. 11.

[Begin Page: Page 20]

— 20 —

1891. *Oleacina eburnea* Klein; sp. Maillard, Mem. de la soc.

paleontol. suisse, vol. XVIII

pg. 6, pl. I, fig. 5-7.

Von dieser hübschen und zierlichen Art fand ich ein

Exemplar im Innern einer zufällig zerbrochenen grösseren

Helicee. Es erreicht bei 5 Umgängen 11 mm Höhe und

3,5 mm grösste Breite. Ich konnte dasselbe mit Exemplaren aus den gleichalten Schichten Württembergs (Andelfinger Berg unweit Riedlingen a. D. 1 Ex., Bechingen bei Zwiefaltendorf 1 Ex., Mörsingen bei Zwiefalten 2 Ex.) und der Schweiz (le Locle Ct. de Neuchâtel 1 Ex.) vergleichen und fand es bis auf geringe Grössenunterschiede mit jenen vollkommen übereinstimmend.

2. *Ärchaezonites costatus* Sandberger.

1874. *Arch. costatus* Sandberger; Vorwelt, S. 604.

1885. n n i> Clessin, Malakozool. Blätter

N. F. Bd. VIII S. 76.

1892. » » » » Ber. d. naturwiss.

Ver. zu Regensburg,

IV. Heft S. 7.

1907. , » » » Kinkelin, Schriften

d. Ver. f. Gesch.

d. Bodensees, Heft

XXXVI S. 11.

Diese Art, welche ich an anderen Orten näher zu

beschreiben gedenke, liegt mir in einem Bruchstück von
3² Windungen vor, dessen Erhaltungszustand zu wünschen
übrig lässt. Aus dem Obermiocän Württembergs kenne ich
A. costatus von Mörsingen bei Zwiefalten, Stubersheim bei
Geislingen und Laichingen. Aus den gleichalten Schichten
Baierns ist er bekannt von Undorf bei Regensburg, Hader
und Kutzenhausen bei Dinkelscherben, sowie vom Gutz-
grieder Graben am Peissenberg. Im Obermiocän der Schweiz
scheint er eigentümlicherweise nicht vorzukommen, wenigstens
zitiert ihn Maillard in seiner Arbeit nicht.

[Begin Page: Page 21]

— 21 —

3. *Klikia osculum* Thomä, var. *giengensis* Krauss.

1846. *Helix giengensis* Krauss; Klein, Würtlemb. naturwiss-

Jahresliefte , Bd. II

S. 69, Taf. I, Fig. 9.

1853. „ » t, n Württemb. naturwiss.

Jahreshefte , Bd. IX

S. 209.

1854. „ „ „ Gobanz, Sitzungsber. d. k. k.

Akad. d.Wiss. zu Wien,

math. natw. Bd. XIII

S. 193.

1874. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.);

Saridberger, Vorwelt S. 585, Taf. XXIX, Fig. 4 -4b.

1877. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.);

Glessin, Regensburger Korr.-Blatt S. 36.

1885. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.) ;

iMalakozool. Blätter N. F. Bd. VIII S. 77.

1891. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.);

Maillard, Mem. de la soc. paleontol. suisse, vol. XVIII

pg. 69. pl. I, fig. 12 -12 b.

1891. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä); Penecke, Zeitschr.
d. d. geol. Ges., Bd. XLIII S. 359.

1892. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.);
Clessin, Ber. d. naturwiss. Ver. zu Regensburg, IV. Heft
S. 7.

1907. H. (*Gonostoma*) *osculum* (Thomä) var. *giengensis* (Kr.);
Kinkelin, Schriften d. Ver. f. Gesch. des Bodensees,
Heft XXXVI S. 11.

Das einzige, etwas zerdrückte Exemplar dieser sonst
im Obermiocän verbreiteten und häufigen Art zeigt bei
5² Umgängen 10 mm Durchmesser und 6 mm Höhe. Die
Mündung weisst 5 mm Durchmesser und 4 mm Höhe.

[Begin Page: Page 22]

— 22 —

4. *Tachea sylvana* v. Klein.

1848. *Helix sylvana* Klein; Dunker, Palaeontographica, Bd. I

S. 163, Taf. XXXI, Fig. 3-5.

1853. » » » Württemb.naturwiss. Jahreshefte,

Bd. IX S. 205, Taf. V, Fig. 2.

1874. 9 (Macularia) sylvana Klein ; Sandberger, Vorwelt,

S. 592, Taf. XXIX,

Fig. 13— 13 a, b, c.

1877. » » if » Glessin, Regensburger

Korr.-Blatt S. 36.

1885. » » » Glessin, Malakozool.

Blätter N. F. Bd. VIII

S. 78.

1891. „ , n „ Maillard, Mem. de la

soc. paleontol. suisse,

vol. XVIII pg. 36,

pl. III, fig. 6-8.

1892. n r, » » Glessin, Ber. d. natur-

wiss.Ver. zu Regens-

burg, IV. Heft S. 7.

1907. „ (Pentataenia) , „ Kinkelin, Schriften d.

Ver. f. Gesch. d. Bo-
densees, Heft XXXVI

S. 11.

Von dieser als Leitfossil charakteristischen Art liegen
zahlreiche Exemplare vor, unter denen einzelne sogar noch
deutlich eine 3 — 4 fache Bänderung erkennen lassen. Die
Größenverhältnisse schwanken zwischen 16—18 mm Höhe
und 19 — 21 mm Breite bei 4V2 -o Umgängen. Durchmesser
der Mündung 9 — 10 mm, Höhe derselben 7— 8V2 mm.

5. *Chilostoma inflexa* v. Klein.

1846. *Helix inflexa* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshfte,

Bd. II S. 71, Taf. I, Fig. 12.

[Begin Page: Page 23]

— 23 -

1853. *Helix inflexa* Klein; Württemb. naturwiss. Jahreshfte,

Bd. IX S. 208.

1854. „ „ Gobanz, Sitzungsber. d. k. k. Akad. d.

Wiss. zu Wien, math. natw. Kl.

Bd. XIII S. 192.

1874. „ (Campylaea) inflexa Klein ; Sandberger, Vorwelt,

S. 589, Taf. XXIX,

Fig. 8— 8 b.

1877. » » » » Glessin, Regensburger

Korr.-Blatt S. 36.

1885. » » » » Glessin, Malakozool,

Blätter N. F. Bd. VIII

S. 78.

1891. , , , , Maillard, Mem. de la

soc. paleontol. suisse,

vol. XVIII pag. 24.

pl. II. fig. 9-9 d.

1891. , , , , Penecke, Zeitschr. d.

d.geol.Ges.,Bd.XLIII

S. 562.

1892. » , n n Glessin, Ber. d. natur-

wiss. Ver. zu Regens-

burg, IV. Heft S. 7.

1907. „ n » » KinkelJn, Schriften d.

Ver. f. Gesch. d. Bo-

densees, Heft XXXVI

S. 11.

Seltener als wie die vorige findet sich diese Art im Obermiocän des Pfänders. Ich besitze 4 guterhaltene Exemplare von 22 — 24 mm Durchmesser und 19 — 22 mm Höhe bei $4\sqrt{4}$ — 5^2 Umgängen. Der Durchmesser der Mündung beträgt 10—13 mm, die Höhe derselben 9 — 12 mm. Die Art ist sonst als Leitfossil verbreitet und häufig im Obermiocän. Als grosse Seltenheit findet sie sich auch im

[Begin Page: Page 24]

- 24

Untermiocän von Reun in Steyermark zusammen mit der ihr sehr nahestehenden Gh. standfesti (Penecke), die ihre Stammart zu sein scheint.

6. *Triphychia* (*Eutriptychia*) *helvetica* Mayer-Eymar.

Clausilia helvetica G. Mayer; in coli, polyt. helvet.

1874. „ (Triptychia) helvetica G. Mayer ; Sandberger, Vor-
welt, S. 598.

1877. » » » » Böttger, Palaeon-

tographica N. F.

Suppl. III S. 15.

1891. , „ „ „ Maillard, Mem.de

la soc. paleontol.

suisse, vol. XVIII

pg. 82, pl. IV,

fig. 3-4.

1907. » » » » Kinkelin, Schriften

d. Ver. f. Gesch.

des Bodensees,

HeftXXXVIS.il.

[Begin Page: Page 25]

— 25 -

Die grosse Schale ist von bauchig-spindelförmiger
Gestalt mit stumpfer, sehr schwach knopfförmig verdickter
Spitze und steilgeneigter, mit engem Nabelritze versehener

Grundfläche. Sie besteht aus 16 massig gewölbten, durch schmale seichte Nähte getrennten Umgängen, die im Alter nicht abgeworfen werden und von denen die 3 ersten glatt, die übrigen mit zahlreichen, groben, schwach bogigen Rippchen bedeckt sind, welche auf dem letzten in undeutlich ausgeprägte Bänder übergehen. Der abgerundete letzte Umgang erreicht nicht ganz ein Drittel der Gesamthöhe. Die birnförmige Mündung ist innen gelippt, oben mit langem spitzen Sinulus versehen und besitzt miteinander verbundene, verdickt umgeschlagene Ränder, von denen der linke abgerundet ist und der obere sich in S-förmigem Bogen ablöst. Die ziemlich schwach entwickelten Lamellen erreichen den Aussenrand nicht; die obere, beinahe senkrechte, verbindet sich mit der Spirallamelle, die untere und die Subcolumellarlamelle drehen sich, übereinandergestellt, nach oben. Prinzipal-, Mond- und Gaumenfalte fehlen.

Es liegen mir vom Pfänder mehrere, zum Teil recht gut erhaltene Exemplare vor, deren Grössenverhältnisse sind ; Höhe 48-52 mm, Breite 14-17V3 mm, Mündungshöhe 13—14 mm, Mündungsbreite 7—8 mm.

Im Obermiocän Württembergs wurde diese Art bis jetzt beobachtet am Andelfmger Berg nahe Riedlingen, und an der Adelegg in Oberschwaben; in den gleichalten Schichten der Schweiz bei St. Gallen, Rosenberg bei St. Gallen, Katzenstrebel (Kt. St. Gallen), Reuenthal (Kt. Zürich), Rüti, Dürnten, Hombrechtikon, Bäretschwyl, Baarburg (Kt. Zug),

Bötzberg (Kt. Aargau), Courfaivre und Sitzberg bei Wyd (Kt. Bern). Nach Sandberger soll *Tr. helvetica* endlich auch noch im Obermiocän von Laymont im südwestlichen Frankreich vorkommen.

[Begin Page: Page 26]

- 26 -

Auf die Unterschiede zwischen dieser Art und der im Untermiocän von Acs an der Donau vorkommenden *Tr. limbata* hat Sandberger bereits a. a. O. hingewiesen. Lebende Verwandte fehlen wie überhaupt beim ganzen Genus.

Das seltene Vorkommen sowie der meist sehr schlechte Erhaltungszustand der einzelnen Exemplare haben bis jetzt eine genauere Charakterisierung dieser Art nicht erlaubt. Sandberger erwähnt sie nur flüchtig, Böttger kennt die Art überhaupt nicht; Maillard gibt zwar in seiner Monographie eine Beschreibung und Abbildung, doch lässt erstere an Ausführlichkeit, letztere an Deutlichkeit zu wünschen übrig.

7. *Triptychia* (*Eutriptychia*) *teutonica* n. sp.

Unter zahlreichen Fragmenten der vorhergehenden Art fand sich ein aus den 10 ersten Windungen bestehendes Bruchstück einer schlanken *Triptychia*, das sich nach sorgfältigen Vergleichen mit einer neuen Art identisch erwies,

welche von mir bei Mörsingen in Württemberg gefunden wurde und unter dem Namen *Tr. teutonica* an anderen Orten beschrieben und abgebildet werden soll. Vorerst begnüge ich mich damit, auf das Vorkommen dieser neuen Art auch im Obermiocän des Pfänders kurz hinzuweisen.

8. *Pseudidyla mörsingensis* Sandberger.

1874. Claus. (*Pseudidyla*) *mörsingensis* Sandberger; Vorwelt'

S. 598.

1877. Claus. (*Pseudidyla*) *mörsingensis* Sandberger; Böttger,

Palaeontographica, N. F. Suppl. III S. 89, Taf. III,

Fig. 32 a bis d.

1907. Claus. (*Pseudidyla*) *mörsingensis* Sandberger; Kinkehn,

Schriften d. Ver. f. Gesch. d. Bodensees, Heft XXXVI

S. 11.

Von dieser kleinen zierlichen Form fand ich ein Bruchstück, dem leider die Mündung fehlt. Ich besitze Ps.

[Begin Page: Page 27]

mörsingensis sonst noch aus denn Obermiocän von Mörsingen bei Zwiefalten in Württemberg und le Locle (Ct. de Neuchâtel).

9. *Limnaeus (Limnus) dilatatus* Noulet ; forma juvenilis.

1846. *Limnaeus eliipticus* Kurr; Klein, Württemb. naturwiss. Jahreshfte, Bd. II S. 83, Taf. II, Fig. 5 a und b.

1848. „ *pachygaster* Thomä; Dunker, Palaeontographica, Bd. I S. 160.

1854. „ *dilatatus* Noulet; Mem. sur les coqu. foss.

d'eau douce du S. Ouest de la France, I ed. pg. 107.

1864. „ „ „ le meme II ed. pg. 167.

1864. » » » Deshayes, descript. des

anim. sans vert. t. II pg.704,pl.XLIV,fig.3-4.

1874. » » » Sandberger, Vorwelt,

S. 580, Taf. XXVIII,

Fig. 24— 24 a.

1881. n n » Bourguignat, BibHoth. de

l'ecole des hautes etudes,

pg. 112, pl.VI, fig. 193.

1891. „ „ „ Maillard, Mem. de la

soc. paleontol. suisse,

vol.XVIIIpg.IIO, pl.VII,

fig. 8— IOV2.

1 900. „ „ „ Miller, Württemb. natur-

wiss. Jahreshefte, Bd. LVI

S. 400, Taf. VII, Fig. 20.

1907. „ „ „ Kinkelin, Schriften d.Ver.

f. Gesch. d. Bodensees

HeftXXXVIS.il.

Mehrere unausgewachsene Exemplare dieser sonst im

Obermiocän verbreiteten und häufigen Art liegen mir vom

Pfänder vor.

[Begin Page: Page 28]

— 28 —

10. *Melania escheri* Brogniart.

1822. *Melania escheri* Brogniart; Description geol. des env.
de Paris, pg. 117.

1846. » *turrita* Klein; Württemb. naturwiss. Jahres-
hefte, Bd. II S. 81, Taf. II, Fig. 2.

1849. „ *escheri* Merian; Basler Verhandlungen, Bd. VIII
S. 33.

1851. „ *wetzleri* Dunker; Palaeontographica, Bd. I
S. 157, Taf. XXI, Fig. 1 und 2Va.

1852. „ *grossecostata* Klein; Württemb. naturwiss.
Jahreshefte, Bd. VIII S. 158, Taf. III, Fig. 10
und 11.

1853. „ *escheri* Greppin; Studer, Geologie der Schweiz,
Bd. II S. 407.

1853. „ *grossecostata* Klein; Württemb. naturwiss.

Jahreshefte, Bd. IX S. 221, Taf. V, Fig. 19.

1856. 2 „ escheri (Brogn.), Hörnes, Die foss. Mollusken

d. Wiener tret. Beckens, S. 602, Taf. XLIX,

Fig. 16 a und b.

1874. „ escheri (Brogn.), Sandberger, Vor weit, S. 572,

Taf. XXVIII, Fig. 14 (var. grossecostata;

Fig. 14 a typus; Fig. 15 b var. rotundata).

Das häufige Variieren dieser Art veranlasste seither eine grössere Anzahl Palaeontologen, verschiedene neue Arten und Varietäten abzutrennen, doch lässt sich bei grösserem Material aus verschiedenen Schichten eine wirkliche Grenze nicht ziehen, was schon Hörnes a. a. O. ganz richtig bemerkt. So besitze ich z. B. forma rotundata aus dem Unter- und Obermiocän Württembergs, ebenso die als Typus charakteristische grobrippige Form. Was mir vom Pfänder vorliegt, dürfte der forma rotundata entsprechen, doch ist der Erhaltungszustand der drei Bruchstücke von 2V2 — 4/* Umgängen ein ziemlich mangelhafter. Uebrigens werde ich auf diese Art a. a. O. näher eingehen.

[Begin Page: Page 29]

Von den zehn im Obermiocän des Pfänders gefundenen Schneckenarten sind nur zwei Wasserbewohner, nämlich *Limnaeus dilatatus* und *Melania escheri*. Alle anderen sind Bewohner des Festlandes, die teils unter Laub und Moos, teils an Bäumen oder auf Felsen ihr Leben fristeten und wohl durch Regengüsse in den damaligen Obermiocänsee geschwemmt wurden. Darunter sind die gemeinsten, die als Leitfossilien des Obermiocäns bekannten Gharakter-schnecken *Tachea sylvana* und *Ghilostoma inflexa*. Ihnen gesellt sich eine fleischfressende Art : *Archaeozonites costatus* bei, sowie zwei *Triptychien*arten, von denen besonders *Tr. helvetica* durch ihre Grösse und guten Erhaltungszustand auffällt. Die Schliessschnecken sind durch *Pseudidyla mör-singensis* vertreten.

Wenn es auch nur eine beschränkte Anzahl von Arten ist, die mir vom Pfänder vorliegen, so beweisen sie doch, dass der obermiocäne Sandstein, wie er im südlichen Teil der schweizerisch-schwäbischen Hochebene ansteht, doch nicht so fossilienarm ist, wie er allgemein bezeichnet wird, sondern bei genauerer Durchforschung wohl noch manches Interessante liefern dürfte.

lieber *Physa acuta* Drap, und deren Torkommen in Rnssland.

Von

W. A. Lindholm, Moskau.

Ueber das allmähliche Vordringen von *Physa acuta*

Drap, nach Osten, deren ursprüngliche Heimat Südwesteuropa und Nordwestafrika sind, ist in letzter Zeit wiederholt berichtet worden. Für diese andauernde Ausdehnung des Verbreitungsgebietes sind in erster Linie die Aquarienliebhaberei und der Handel mit Süßwasserpflanzen verantwortlich zu machen. Auf diese Weise ist *Physa acuta*