







Übersicht der eingearbeiteten Karten



Kompilation:
M. Moser (GBA, 2019)

Hinweis für Nutzer/-innen
GEOFAST-Karten werden überwiegend aus Archivunterlagen der Geologischen Bundesanstalt erstellt. Ergänzend können auch publizierte Karten, meist älteren Datums, in die Zusammenstellung einfließen. Eine Überprüfung durch zusätzliche Geländebegehungen erfolgt nicht. Diskontinuitäten zwischen den verwendeten Kartenunterlagen verschiedener Autoren werden bewusst beibehalten und können sich als Sprünge in den Konturlinien äußern. Geologische Inhalte werden in die aktuellen stratigraphischen und tektonischen Modelle überführt. Aufgrund der Übertragung der geologischen Inhalte von Karten mit veralteter Topografie und größeren Maßstäben in die aktuelle topografische Grundlage sind Lagegenauigkeiten vorhanden.



QUARTÄRE SEDIMENTE UND FORMEN

1

Bach- oder Flussablagerung, Austufe größerer Gerinne (Schluff, Sand, Kies)

2

Vernässung, Anmoor, Niedermoor

3

Schwemmkegel, Murkegel

9

Rutschhang, Fließerde, Rutschmasse, Hangrutschung, Kriechhang, Hangfließen, Bergschliff

4

Grund- und Ablationsmoränenablagerung (Till, feinstoffreicher Diamikt; Würm)

5

End- und Seitenmoränen-Ablagerung (Blöcke, Kies, Sand, Schluff, unsortiert; Würm)

6

Moränenwall

6

Niederterrasse (Kies, Sand, Schluff; Würm)

23

Zwischenterrasse (Würm)

7

Grund- und Ablationsmoränenablagerung (Till, feinstoffreicher Diamikt; Riß)

14

Hochterrasse (Konglomerat, Kies, Sand, Schluff, Lösslehm-Bedeckung; Riß)

9

Grund- und Ablationsmoränenablagerung (Till, feinstoffreicher Diamikt; Mindel)

10

End- und Seitenmoränen-Ablagerung (Blöcke, Kies, Sand, Schluff, unsortiert; Mindel)

10

Moränenwall

11

Jüngere Deckenschotter (Kies, Sand, Konglomerat, lokal mit Lehm-Bedeckung; Mindel)

12

Grund- und Ablationsmoränenablagerung (Till, feinstoffreicher Diamikt; Günz)

14

Ältere Deckenschotter (Kies, Sand, Konglomerat, stark verwittert, lokal mit Lehm-Bedeckung; Günz)

18

Vorstößschotter mit Moränenbedeckung (Konglomerierte, feinkörnige, polymikte Schotter; Günz)

15

Eichwaldschotter (quarreiche, stark verwitterte Restschotter; Gelasium)

HOLOCÄN

PLEISTÖZEN

AUTOCHTHONE MOLASSE UND OLIGOZÄN-NEOGENE SEDIMENTE AUF DER BÖHMISCHEN MASSE

16

Hausruck-Formation (sandiger Kies, polymikt, fluviatil; Pannonium)

17

Kobernaußerwald-Formation inkl. Munderfingrer Schotter (Quarkies, geschichtetes Konglomerat, Sandlagen, Ton, Imnisch-fluviatil; "Sarmatium-Pannonium")

27

"Kohleführende Süßwasserschichten", Trimmelkammer, Radeigunder Schichtenfolge (Ton, Kohle, Sand, Schotter; Badenium - Sarmatium)

28

Traubach-Formation (hellgrauer-gelber, glimmeriger, feiner massiger Quarzsand mit Glaukonit und Pelitklasten, marin; Mittleres Othangium)

29

Braunau-Formation (grüngrauer-bräunlicher, glimmeriger, sandiger Tonsilt mit Feinsandlagen, marin; Mittleres Othangium)

26

Mehrbach-Formation (hellgrauer, glimmeriger, Glaukonit führender Fein- bis Mittelsand, marin; Mittleres Othangium)

22

Wachtberg-Formation (polymikte, schlecht sortierte, gut gerundete Kiese, siltige Sande, Tonmergellagen, marin; Eggenburgium - Othangium)

DIVERSE ZEICHEN

Störung (vermutet)

Sonstige

Terrassenkante, Erosionskante

Abrißkante, Rutschung (gesichert)

Gewässer

1 : 50 000 (1 cm $\approx$ 500 m)

500

0

1000

2000

3000

4000

5000 m

Gauß-Krüger-Abbildung, Koordinatensystem M 34 des Bundesmeldenetzes