FARBEN-ERKLÄRUNG.

Alluvium.

- a — Alluvionen.
- Mineral-Quellen-Thermen.

Diluvium.

- al — Löss.
- as — Terrassen-Schotter.

Tertiär-Formation.

Neogen.

Thracische Stufe.

- nb — Belvedere-Schotter und Sand.
- nbk — Süsswasserkalk von Weikersdorf.

Levantinische Stufe.

- npt — Paludinen-Tegel (Ziegelei b. Moosbrunn).
- nps — Paludinen-Tegelsand.
- npk — Paludinen-Süsswasserkalk.

Congerien-Stufe (Caspische, Pannonische, Pontische).

- nct — Congerien-Tegel.
- ncs — Congerien-Sand, Schotter u. Conglomerate mit Melanopsiden.

Sarmatische Stufe.

- nst — Hernalser Tegel.
- nsc — Cerithien-Sande, Sandsteine mit riesigen Anhäufungen von Schotter und Blöcken.

Mediterrane Stufe.

- nl — Leithakalk, Nulliporenkalk, Lithothamnien-, Amphisteginen-Schichten.
- nlc — Leitha-Conglomerat.
- nls — Leitha-Schotter mit Balanen.
- nh — Schlier im oberen Donaubecken.
- nhs — Sand und Sandstein im ob. Donaubecken.
- nmt — Mediterraner Süsswasser-Tegel.
- nmt' — Mediterraner mariner Tegel.
- nms — Mediterraner mariner Sand und Schotter.

Aquitanische Stufe.

- sc — Sotzka-Conglomerat.
- sh — Sotzka-, Kohlen- u. Hangendschichten.

Eocän.

- ew — Wolfpassinger Schichten.
- eg — Greifensteiner Nummuliten-Sandstein.
- eb (r) — Bunte, Schiefer- und Sandsteinschichten. Mit r sind die auffallend rothen Terrainstellen bezeichnet.
- er — Barton-Schichten von der Reingrubhöhe.
- ew — Waschberg-Nummuliten-Kalk.
- el — Hollingsteiner Schichten mit Lucina globulosa Desh.
- ep — Pfaffenholz-Schichten mit Mytilus Levesquei Desh.

Kreide-Formation.

- kgm — Gosau-Mergel und Sandstein.
- kgc — Gosau-Conglomerat.
- ko — Orbitoiden-Sandstein.
- ki — Inoceramen, Mergel- und Sandst. d. Wienerwandsteins.
- kb — Kreide-Schichten von Brudersdorf.

Neocom.

- n — Neocomer Aptychenkalk mit Hornsteinen.

Jura.

- j — Tithonischer Aptychenkalk mit Hornsteinen.
- du — Unterer und Mittlerer Dogger (Zone des A. Sauzei u. Humphriesianus)
- do — Oberer Dogger (Zone d. A. Parkinsoni) Klauskalk.

Lias.

- lg — Grestener Kalk.
- le — Enzesfelder gelber Kalk.
- lh — Hierlatz-Kalk.
- lf — Flecken-Mergel.
- ls — Grestener Sandstein.

Trias.

Rhaet.

- rk — Kössener Schichten.
- rdk — Dachstein-Kalk.
- rdd — Dachstein-Dolomit.

Keuper.

- o — Opponitzer Kalk.
- od — Opponitzer Dolomit.
- or — Rauhwacke.

Letten-Kohle.

- lz — Lunzer Sandstein auch Trachyceras- und Reingrabner-Schiefer.

Muschelkalk.

- mo — Oberer Muschelkalk, Reiflinger-Platten-, Knollen-) Kalk.
- mod — Reiflinger Dolomit.
- mor — Rauhwacke.
- mu — Unterer Muschelkalk, Guttensteiner Kalk

Bunter Sandstein.

- w — Werfener Schiefer.
- g — Gyps.

Silur.

- sq — Silur-Quarzit.
- skd — Silurkalk und Dolomit.

Archaeische Gesteine.

- gr — Granit.
- gn — Gneis.
- ph — Phyllit.

Landshut, Schlossberg u. Hohenau
Hamburg
Terrainschraffirung v. Lieut. Kuzmin
884