

GEOLOGISCHE KARTE DER REPUBLIK ÖSTERREICH 1: 25.000

Herausgegeben von der Geologischen Bundesanstalt, Wien 1982

82 BREGENZ


0816

Aufgenommen von PAUL HERRMANN (österreichischer Gebietsanteil) und KLAUS SCHWED (Gebietsanteil der BRD)




- Quartär
- 1 Anthropogener Schuttkörper
 - 2 Moor i.a.: Nieder- bis Übergangsmoor (österr. Gebietsanteil)
 - 3 Bachschutt, Aue
 - 4 Leblachsand (subrezent)
 - 5 Rheintalfüllung (Schotter, Sand)
 - 6 Hangschutt
 - 7 Blockschutt
 - 8 Rutschmasse, Abrißkante und Stauchwulst
 - 9 Abrißkante, kleiner Rutschkörper
 - 10 Seeablagerung (Ton, Sand)
 - 11 Schotter, Sand
 - 12 Schwemmkegel
 - 13 Seeablagerung (Ton, Sand)
 - 14 Schotter, Sand
 - 15 Schotter der Olriterrasse
 - 16 Seitenmoräne des Konstanz Stadiums i.w.S.
 - 17 Moräne
 - 18 Moränenwall
 - 19 Drumlin
 - 20 Totisloch
 - 21 Schotter, Sand (früh- bis hochglazial)
 - 22 Moräne (? Riß)
 - 23 Moräne, Schotter, Nagelfluh, Seeablagerung
- Postglazial
- Spät- bis Postglazial
- Spätglazial
- Würm
- Präwürm
- Tertiär
- 24 Nagelfluh, Schluff (? Ottmang - Obermiozän)
 - 25 Mächtiger Nagelfluhorizont darin
 - 26 Süßwasserkalk darin
 - 27 „St. Galler Schichten“ (Nagelfluh, Sandstein; Eggenburg - Ottmang)
 - 28 Mächtiger Nagelfluhorizont darin
 - 29 „Luzerner Schichten“ (Sandstein, Nagelfluh; Eggenburg)
 - 30 Mächtiger Nagelfluhorizont darin
- Oberer Subwassermolasse
- Oberer Meeresmolasse
- Zeichen
- Flaches Einfallen der Schichtung
 - Terrassenkante
 - Ehemaliger Bergbau
 - Fossilfundpunkt von
 - Säugetieren und Mollusken
 - Mollusken
 - Holz

Tektonische Übersicht 1:200.000



Quartäre Bedeckung Tertiär der Äußerer Molasse

Lage der Karte in Österreich



Erhältlich im Verlag der Geologischen Bundesanstalt, A-1030 Wien, Rasumofskygasse 23 und im Buchhandel.
© Geologie: Geologische Bundesanstalt

1 : 25.000

0 500 1000 2000m

Gauß-Krüger-Projektion (3° Streifen), geographische Länge von Ferro = geographische Länge von Greenwich + 17° 40'00"
Höhen bezogen auf das Mittelwasser der Adria bei Triest, Äquidistanz der Schichtenlinien: 20 m
Gauß-Krüger-Koordinatensystem M 28
y-Werte im OMK-System (y-km/Wert im OMK-System = y-km/Wert der österr. Landeskoordinaten + 450)
Verwendung des OMK-Systems, genehmigt vom Bundesministerium f. Landesverteidigung gem. Z. 305.209-FÜ/74

Direktor der Geologischen Bundesanstalt: F. RÖNNER, Leiter der geologischen Landesaufnahme: W. JANDOSCHER, Kartomodifikation: A. MATURIA, Graphische Gestaltung: O. BINDER, Reproduktionstechnische Arbeiten: Geologische Bundesanstalt

Pascher Günther

Druck: Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artans, Wien